

УПАТСТВО ВО ПАКУВАЊЕТО: ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ
BRONLES®/ БРОНЛЕС 375 mg капсула, тврда
carbocisteine

Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го упатството бидејќи содржи важни информации за Вас.

Овој лек се издава без рецепт. И покрај тоа, треба да го употребувате претпазливо за да Ви биде што повеќе од корист.

- Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Советувајте се со Вашиот фармацевт ако Ви се потребни дополнителни податоци.
- Ако некоја од несаканите појави стане сериозна или ако забележите несакана појава која не е наведена во ова упатство, Ве молиме известете го Вашиот доктор или фармацевт.
- Ако симптомите на Вашата болест не се подобрат во текот на 5 дена, тогаш мора да појдете на доктор.

Упатството содржи:

1. Што претставува Бронлес и за што се употребува
2. Што мора да знаете пред да употребите Бронлес
3. Како да се употребува Бронлес
4. Можни несакани дејства
5. Како да се чува Бронлес
6. Дополнителни информации

1. ШТО ПРЕТСТАВУВА БРОНЛЕС И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА

Лекот Бронлес 375 mg капсули, тврди ја содржи активната супстанција карбоцистеин. Спаѓа во групата лекови наречени муколитичи. Дејствува на тој начин што го прави секретот помалку леплив, со што се овозможува негово полесно искашлување. Бронлес се користи за проблеми со дишните патишта (респираторен систем). Овие проблеми се појавуваат кога прекумерно се создава секрет или кога секретот е премногу леплив.

2. ШТО МОРА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА УПОТРЕБИТЕ БРОНЛЕС

Немојте да употребувате Бронлес ако:

- сте алергични (преосетливи) на карбоцистеин или на некоја помошна состојка на Бронлес (наведени во делот 6). Знаци на алергиска реакција се: исип, проблеми со голтањето или со дишењето, отекување на усните, лицето, грлото или на јазикот.
- имате активен чир на желудникот или на цревата.

Не го земајте лекот ако нешто од горенаведеното се однесува на Вас. Ако не сте сигурни, консултирајте се со Вашиот доктор или фармацевт пред да земете Бронлес.

Бидете особено претпазливи со Бронлес и известете го Вашиот доктор ако:

- сте постари;
- имате анамнеза за чир на желудникот или на цревата;
- земате други лекови за кои е познато дека предизвикуваат крварење во желудникот.

Бременост и доене

Примената на Бронлес не се препорачува за време на бременост или доене.

Известете го Вашиот доктор пред да го земете овој лек ако:

- сте бремена, планирате да забремените или ако мислите дека сте бремена.



- доите или планирате да доите.

Важна информација за некоја од состојките на лекот

Овој лек содржи помалку од 1 mmol натриум (23 mg) по капсула, т.е. во суштина е „без натриум.

3. КАКО ДА СЕ УПОТРЕБУВА БРОНЛЕС

Секогаш употребувајте Бронлес точно онака како што е опишано во ова упатство или како што Ви препорачале докторот или фармацевтот.
Ако не сте сигурни за нешто, консултирајте се со својот доктор или со фармацевт.

Земање на лекот

- Земете го овој лек преку уста.
- Ако чувствувате дека лекот е премногу слаб или премногу јак, не ја менувајте сами дозата туку консултирајте се со Вашиот доктор.

Препорачано дозирање

Возрасни, вклучувајќи и постари лица

- Вообичаена доза е 2 капсули 3 пати дневно.
- Ако Вашите симптоми се подобрат, дозата треба да се намали на 1 капсула 4 пати дневно.

Деца

Капсулите Бронлес не се наменети за деца. Оралниот раствор, како посебна форма на овој лек, наречен Бронлес за деца 125 mg/5 ml орален раствор, е наменет за деца.

Ако сте зеле поголема доза Бронлес отколку што треба

Ако сте зеле повеќе капсули отколку што треба, известете го докторот или побарајте помош во здравствена установа. Земете го пакувањето од лекот со Вас за докторот да знае каков лек сте зеле. Ако сте зеле премногу капсули, возможно е да добиете желудочни проблеми (гастроинтестинални нарушувања).

Ако сте заборавиле да земете Бронлес

Ако сте заборавиле една доза, не се грижете; само почекајте да дојде време за следната доза. Не земајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената.

Мора да се консултирате со Вашиот доктор ако не се чувствувате подобро или ако се чувствувате полошо по 5 дена.

Ако имате дополнителни прашања за употребата на овој лек, обратете се кај Вашиот доктор или фармацевт.

4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА

Како и сите други лекови и Бронлес може да предизвика несакани дејства, кои не се појавуваат кај сите пациенти.

Престанете со употреба на Бронлес и веднаш известете го Вашиот доктор или одете во најблиската болница ако имате:

- алергиска реакција која вклучува: исип, тешкотии при голтањето и при дишењето, оток на усните, лицето, грлото или на јазикот;
- меурчиња или крвавење на кожата, вклучувајќи го пределот околу усните, очите, устата, носот и гениталиите. Исто така може да имате и симптоми слични на грип и на треска. Ова може да бидат знаци за Стивенс-Джонсонов синдром.



- крв во повратената желудочна содржина или црна, катранеста столица.

Известете го Вашиот доктор или фармацевт ако забележите некој од следните несакани ефекти стане сериозно или трае подолго од неколку дена:

- гадење или повраќање;
- пролив;
- стомачна болка.

Ако кој било несакан ефект станува сериозен или ако забележите несакан ефект кој не е наведен во ова упатство, Ве молиме да го известите Вашиот доктор или фармацевт.

Пријавување на несаканите дејства

Ако забележите какво било несакано дејство, треба да го известите Вашиот лекар или фармацевт. Тоа го вклучува и секое можно несакано дејство кое не е наведено во ова упатство. Несаканите дејства од лековите може да ги пријавите и во Националниот центар за фармаковигиланца при Агенцијата за лекови и медицински средства (ул.Св.Кирил и Методиј бр.54 кат 1) или по електронски пат преку веб страната на Агенцијата <http://malmed.gov.mk/>.

5. КАКО ДА СЕ ЧУВА БРОНЛЕС

Лекот не бара посебни услови за чување.

Лекот треба да се чува надвор од дофат на деца!

Не употребувајте Бронлес по датумот на истекот на рокот на употреба, наведен на пакувањето.

Датумот на истекот на рокот на употреба се однесува на последниот ден од тој месец.

Лековите не треба да се исфрлаат во отпадна вода ниту во смет од домаќинството. Прашајте го Вашиот фармацевт како да ги отстраните лековите кои повеќе не Ви се потребни. Овие мерки ќе помогнат да се заштити околината.

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Што содржи Бронлес

- *Активна супстанција:* карбоцистеин.
- Една капсула содржи 375 mg карбоцистеин.
- *Помошни супстанции:* манитол; пченкарен скроб; натриум кроскармелоза; натриум лаурил сулфат; колоиден силициум диоксид, безводен; магнезиум стеарат; цврста желатинска капсула [состав на празната капсула: желатин, црвен железо оксид (E 172), титан диоксид (E 171) и жолт железо оксид (E 172)].

Изглед на лекот Бронлес и содржина на пакувањето

Непрозрачни темножолти тврди желатински капсули бр.1, исполнети со белузлав прашок.

Капсулите се спакувани во блистери (PVC/PVDC/алуминиумска фолија). Секој блистер содржи 10 капсули.


Кутијата содржи 30 капсули (3 блистери) и упатство за корисникот.

Начин на издавање на лекот

Лекот може да се издава и/или да се продава без рецепт (БР).

Број и датум на решението за промет

11-4333/4 од 03.11.2017



Производител и носител на одобрението за ставање на лекот во промет

АЛКАЛОИД АД Скопје

бул. Александар Македонски бр. 12

1000 Скопје, Република Северна Македонија

тел.: +389 2 31 04 000

факс: +389 2 31 04 021

www.alkaloid.com.mk

Датум на последната ревизија на упатството

Март, 2022 г.

