

УПАТСТВО ВО ПАКУВАЊЕТО: ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ
FLENTY/ФЛЕНТИ 1 mg/1 g гел
dimetindene maleate

Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го упатството бидејќи содржи важни информации за Вас.

Секогаш употребувајте го овој лек точно онака како што е наведено во ова упатство или како што Ви кажал Вашиот доктор или фармацевт.

- Чувајте го упатството, можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Ако Ви се потребни дополнителни информации, советувајте се со фармацевт.
- Ако забележите некое несакано дејство, известете го Вашиот доктор или фармацевт. Тоа се однесува и на несакани дејства што не се наведени во ова упатство (видете го делот 4).
- Ако по 3 дена не се чувствувате подобро или ако се чувствувате полошо, задолжително посветувајте се со доктор.

Упатството содржи:

1. Што претставува Фленти и за што се употребува
2. Што мора да знаете пред да употребите Фленти
3. Како да се употребува Фленти
4. Можни несакани дејства
5. Како да се чува Фленти
6. Содржина на пакувањето и други информации

1. ШТО ПРЕТСТАВУВА ФЛЕНТИ И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА

Гелот Фленти содржи диметинден малеат, активна супстанција од групата лекови наречени антихистаминици.

Гелот Фленти се употребува за краткотрајно ублажување јадеж предизвикан од реакции на кожата, како што се исип, уртикарија (црвен исип над нивото на кожата), убои од инсекти, изгореници од сонце и површински изгореници (изгореници од прв степен).

Како дејствува гелот Фленти

Фленти го запира јадежот на тој начин што го блокира дејството на хистаминот што се ослободува од телото при алергиска реакција. Гелот навлегува во кожата и за само неколку минути доаѓа до ублажување на јадежот и на иритацијата на кожата. Лекот Фленти има и локално анестетичко дејство.

Ако по 3 дена не се чувствувате подобро или ако се чувствувате полошо, задолжително посветувајте се со доктор.

2. ШТО МОРА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА УПОТРЕБИТЕ ФЛЕНТИ

Немојте да го употребувате гелот Фленти:

- ако сте алергични на диметинден малеат или на некоја од другите супстанции на лекот коишто се наведени во делот 6 (ако не сте сигурни, советувајте се со Вашиот доктор или со фармацевт);
- на оштетена или разранета кожа.



Ако нешто од наведеното се однесува на Вас, не употребувајте го гелот Фленти.

Предупредувања и мерки на претпазливост

Разговарајте со Вашиот доктор или со фармацевт пред да почнете да го употребувате гелот Фленти.

- Избегнувајте долготрајна изложеност на сонце на површината од кожата на која нанесувате Фленти.
- Известете го Вашиот доктор ако Ви се појави многу силен јадеж или големо оштетување на кожата.
- Избегнувајте допир на овој лек со очите или со слузницата.
- Гелот не смее да се нанесува на голема површина од кожата кај доенчиња и кај мали деца и не смее да се нанесува ако кожата е оштетена или воспалена.

Употреба на други лекови и гелот Фленти

Известете го Вашиот доктор или фармацевт ако употребувате, ако неодамна сте употребувале или ако треба да употребувате кој било друг лек.

Бременост, доење и плодност

Ако сте бремена, ако мислите дека сте бремена, ако планирате да забремените или ако доите, прашајте го Вашиот доктор или фармацевт за совет пред да го употребите овој лек.

Не нанесувајте го гелот Фленти на голема површина од кожата за време на бременост и доење, особено ако кожата Ви е оштетена или воспалена. Ако доите, немојте да го нанесувате гелот на брадавиците. Овој лек содржи бензалкониум хлорид. Немојте да го нанесувате на градите ако доите бидејќи доенчето може да го внесе бензалкониум хлоридот преку цицањето.

Влијание врз способноста за возење и за ракување со машини

Нанесувањето на гелот Фленти на кожата не влијае врз способноста за возење и за ракување со машини или влијанието е занемарливо.

Гелот Фленти содржи бензалкониум хлорид

1 g од овој лек содржи 0,05 mg бензалкониум хлорид.

Бензалкониум хлоридот може да предизвика иритација на кожата. Ако доите, овој лек не смее да го нанесувате на градите бидејќи доенчето може да го внесе преку цицањето.

Гелот Фленти содржи пропилен гликол

1 g од овој лек содржи 150 mg пропилен гликол. Пропилен гликол може да предизвика иритација на кожата.

Поради тоа што овој лек содржи пропилен гликол, не употребувајте го кај бебиња помали од 4 недели со отворени рани или на голема површина на распукана или на оштетена кожа (како што се изгореници) без да се посоветувате со доктор или со фармацевт.

3. КАКО ДА СЕ УПОТРЕБУВА ФЛЕНТИ



Секогаш употребувајте го лекот точно онака како што е опишано во ова упатство или точно онака како што Ви кажал Вашиот доктор или фармацевт. Ако не сте сигурни како треба да го употребувате лекот, советувајте се со Вашиот доктор или со фармацевт.

Гелот Фленти се нанесува на зафатената површина од кожата 2 - 4 пати на ден.

Лекот треба да се нанесува само на неоштетена кожа.

Измијте ги рацете по нанесување на гелот (освен ако не го нанесувате гелот на рацете).

Ако симптомите Ви се влошат или ако не Ви се подобрат во рок од 3 дена од употребата на Фленти, посветувајте се со доктор.

Ако сте зеле поголема доза Фленти отколку што треба

Ако Вие или Вашето дете случајно проголтате од гелот Фленти, веднаш јавете се кај Вашиот доктор.

Може да се појават следниве симптоми: поспаност (главно кај возрасни лица), возбуденост, нарушување на координацијата на движењата (атаксија), халуцинации, несакани контракции на мускулите (тонично-клонични спазми), проширени зеници (мидријаза), сува уста, црвенило на лицето со чувство на жештина, задршка на урина и треска. Можно е и снижување на крвниот притисок (хипотензија).

Ако имате прашања во врска со употребата на овој лек, обратете се кај Вашиот доктор или кај фармацевт.

4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА

Како и сите лекови, и овој лек може да предизвика несакани дејства, коишто не се појавуваат кај сите пациенти.

Следниве несакани дејства се со непозната честота (честотата не може да се процени од достапните податоци):

- сува кожа;
- чувство на печење на кожата;
- алергиски исип придружен со јадеж.

Пријавување несакани дејства

Ако забележите какво било несакано дејство, треба да го известите Вашиот доктор или фармацевт. Тоа го вклучува и секое можно несакано дејство што не е наведено во ова упатство. Несаканите дејства од лековите можете да ги пријавите и во Националниот центар за фармаковигиланца при Агенцијата за лекови и медицински средства (ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, кат 1) или по електронски пат преку веб-страницата на Агенцијата - <http://malmed.gov.mk/>. Со пријавување на несаканите дејства можете да придонесете за процената на безбедноста на овој лек.

5. КАКО ДА СЕ ЧУВА ФЛЕНТИ

Лекот треба да се чува надвор од дофат на деца!



Лекот треба да се чува во оригиналното пакување, заштитен од светлина.
Не употребувајте го лекот по датумот на истекот на рокот на употреба, којшто е наведен на пакувањето. Датумот на истекот на рокот на употреба се однесува на последниот ден од тој месец.

Лековите не треба да се фрлаат во отпадна вода ниту во смет од домаќинството.
Прашајте фармацевт како да ги отстраните лековите што веќе не Ви се потребни. Овие мерки ќе помогнат да се заштити животната средина.

6. СОДРЖИНА НА ПАКУВАЊЕТО И ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ

Што содржи Фленти

Активна супстанција: диметинден малеат.

1 g гел содржи 1 mg диметинден малеат.

Помошни супстанции: динатриум едетат; карбомер; натриум хидроксид; бензалкониум хлорид; пропилен гликол и прочистена вода.

Изглед на лекот Фленти и содржина на пакувањето

Фленти е хомоген, безбоен, просирен до малку опалесцентен гел без мирис, спакуван во алуминиумска туба од 30 g, која е затворена со бело полиетиленско капаче. Тубата е спакувана во кутија заедно со упатство за корисникот.

Кутијата содржи една (1) алуминиумска туба со 30 g гел, која е затворена со бело полиетиленско капаче, и упатство за корисникот.

Начин на издавање на лекот

Лекот се издава во аптека без рецепт (БР).

Број и датум на одобрението за ставање на лекот во промет

Производител и носител на одобрението за ставање на лекот во промет

АЛКАЛОИД АД Скопје

бул. Александар Македонски бр. 12

1 000 Скопје, Република Северна Македонија

тел.: +389 2 31 04 000

факс: +389 2 31 04 021

www.alkaloid.com.mk

Датум на последната ревизија на упатството

Јули 2023

