

М. Зрновски

Зрнов

УПАТСТВО ЗА ЛЕКОТ

Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го целото упатство бидејќи содржи многу важни податоци за Вас.

- Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Ако имате дополнителни прашања, обратете се кај Вашиот лекар или фармацевт.
- Овој лек Ви е препишан Вам лично и не треба да им го давате на други лица, бидејќи може да им наштети дури и ако нивните симптоми се исти како Вашите.
- Ако забележите какво било несакано дејство, треба да го известите Вашиот лекар или фармацевт. Тоа го вклучува и секое можно несакано дејство кое не е наведено во ова упатство.

Упатството за пациентот содржи:

1. Што претставува лекот БЕЛОСАЛИК лосион и за што се употребува
2. Што треба да знаете пред да го употребите лекот БЕЛОСАЛИК лосион
3. Како да го употребувате лекот БЕЛОСАЛИК лосион
4. Можни несакани дејства (реакции)
5. Чување и рок на употреба на лекот БЕЛОСАЛИК лосион

BELOSALIC/БЕЛОСАЛИК 0,5 mg + 20 mg/g лосион

бетаметазон, салицилна киселина
(betamethasone, salicylic acid)

Активни супстанции се бетаметазон дипропионат и салицилна киселина.

Еден грам лосион содржи 0,5 mg бетаметазон во форма на бетаметазон дипропионат и 20 mg салицилна киселина.

Помошни супстанции: динатриум едетат, хипромелоза, натриум хидроксид, изопропилен алкохол и вода, прочистена.

Изглед и содржина на пакувањето:

Бистар, безбоен, вискозен раствор.

Шишенце со 50 ml лосион, во кутија.

Име и адреса на носителот на одобрението за ставање на лекот во промет:

БЕЛУПО ДООЕЛ Скопје,

ул. 3- Македонска бригада бр.68, 1000 Скопје, Р. Македонија

Име и адреса на производителот:

Белупо, лекови и козметика, а.д., Улица Даница 5, 48000 Копривница, Хрватска



1. Што претставува лекот БЕЛОСАЛИК лосион и за што се употребува
БЕЛОСАЛИК лосионот содржи две активни материи, бетаметазон дипропионат и салицилна киселина.

Бетаметазон дипропионатот припаѓа на групата лекови која се вика топични кортикостероиди. Класифициран е како „силен кортикостероид“. Овие лекови се нанесуваат врз површината на кожата заради намалување на црвенило и јадеж предизвикани од одредени кожни болести. Салицилната киселина го омекнува горниот многу ороженат слој на кожата, чие создавање ја предизвикала кожната болест. Тоа му овозможува на бетаметазон дипропионатот да навлезе во заболената кожа под тој слој и да придонеси за нејзино заздравување.

Кај возрасни и деца, БЕЛОСАЛИК лосионот се користи за лекување на кожни болести каде горниот слој на кожата е прекриен со слој од луспи. Растворот ќе го отстрани слојот од луспи и ќе го намали црвенилото и јадежот предизвикани од кожната болест.

2. Што треба да знаете пред да го употребите лекот БЕЛОСАЛИК лосион
Не применувајте БЕЛОСАЛИК лосион:

- ако сте алергични (пречувствителни) кон бетаметазон дипропионат или кон некоја друга состојка на овој лек (наведено во поглавјето 6).
- кај било која друга кожна болест, бидејќи може да за влоши, особено ако се работи за розацеа (кожна болест која го зафаќа лицето), акни, дерматитис (воспаление на кожата) околу устата, генитален јадеж, исипување од пелени, орален херпес, варичела и други болести на кожата.

Бидете посебно внимателни со лекот БЕЛОСАЛИК лосион

Обратете се кај Вашиот лекар или фармацевт пред употреба на овој лек.

Овој лек не го применувајте под завој или фластер.

По примена на кортикостероиди врз кожата можат да настапат несакани дејства еднакви на оние како и со кортикостероиди кои се инхалираат или голтаат, а особено на тоа се чувствителни доенчиња и мали деца.

Деца

Ако лосионот се користи почесто отколку што е препорачано или пропишано од страна на лекар, кај децата може да настапи хормонско нарушување со последично нарушување на растот и развојот.

Бременост, доење и плодност

Советувајте се со Вашиот лекар или фармацевт пред да земете било каков лек !

Ако сте бремени или доите, ако сметате дека сте можеби бремени или планирате да имате дете, обратете се кој Вашиот лекар или фармацевт за совет пред употребата на овој лек.

Не го применувајте овај лек ако сте бремени или планирате да имате дете освен ако претходно сте разговарале за тоа со лекар.



БЕЛОСАЛИК лосионот кај бремени жени и доилки треба да се применува само кога тоа е неопходно, односно само во случаи кога користа за мајката е поголема од можниот ризик за плодот.

БЕЛОСАЛИК лосионот не смее да се применува врз дојките пред доење.

3. Како да се употребува лекот БЕЛОСАЛИК лосион

Секогаш применувајте го БЕЛОСАЛИК лосионот точно онака како што Ви рекол лекарот. Проверете со Вашиот лекар или фармацевт доколку не сте сигурни.

Вообичаена доза

Кај возрасни и деца обично неколку капки од БЕЛОСАЛИК лосион треба нежно и во целост да се втријат на заболениот дел на косматиот дел на главата два пати дневно.

При примена на БЕЛОСАЛИК лосион секогаш придржувајте се до следните упатства:

- лосионот применувајте го само врз косматиот дел на главата
- не го нанесувајте лосионот врз косматиот дел на главата на деца подолго од 5 дена
- не применувајте голема количина од лосионот во текот на подолг период (на пример, секој ден во текот на повеќе седмици или месеци)
- избегнувајте допир на лосионот со очите.

Ако сте примениле повеќе БЕЛОСАЛИК лосион отколку што треба

Ако сте примениле повеќе БЕЛОСАЛИК лосион отколку што треба, веднаш треба да се посоветуваат со Вашиот лекар или фармацевт.

Ако Вие (или некој друг) случајно го проголтате лосионот, тоа не би требало да предизвика никакви тегоби. Меѓутоа, ако сте загрижени заради тоа, обратете се кај Вашиот лекар. Ако го користите лосионот почесто отколку што сте требале или на големи подрачја врз кожата, тоа може да влијае на некои хормони. Кај децата тоа може да влијае на растот и развојот. Исто така може да предизвика да чувствувате мачнина и/или повраќање и слушате свонење во ушите.

Доколку не сте го користеле лосионот онака како Ви рекол лекарот и ако сте го користеле пречесто и/или предолго, известете го за тоа Вашиот лекар.

Ако сте заборавиле да го употребите лекот БЕЛОСАЛИК лосион

Не употребувајте зголемена количина за да ја надоместите пропуштената доза.

Ако сте заборавиле да примените БЕЛОСАЛИК лосионот во соодветно време, применете го штом ќе се сетите, а потоа продолжете да го користите во вообичаено време. Не применувајте зголемени количини на БЕЛОСАЛИК лосион за да ја надоместите дозата која сте ја пропуштите.

Ако престанете да го употребувате лекот БЕЛОСАЛИК лосион



Ако сте применувале лосион во текот на подолг период и кожните промени се повлекуваат, не престанувајте наеднаш со употребата на овој лек. Понекогаш при нагло прекинување на лекувањето кожата може да стане црвена и може да чувствувате боцкање и печење. За да го избегнете тоа, посветувајте се со Вашиот лекар кој постепено ќе ја намалува терапијата сè до целосен прекин.

Во случај ако нешто не Ви е јасно или имате прашања во врска со примената на овој лек, обратете му се на Вашиот лекар или фармацевт.

4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА

Како и сите други лекови БЕЛОСАЛИК лосионот може да предизвика несакани дејства, иако тие нема да се развијат кај секој.

Несаканите дејства можат да бидат локални, на местото на примената и системски, како последица на системска апсорпција на лекот во крвотокот.

Чести несакани дејства (се јавуваат кај 1 на 10 болни)

Истанчување на кожата, стрии, точкесто крвавење во кожата, видливо проширување на капиларите во кожата, иритација на кожата, сува или испукана кожа на местото на примена, воспаление на коренот на влакното, зголемена влакнавоост на кожата, акни, црвенило, отоци и воспалени меурчиња на кожата, исипување, печење, јадеж, промена на бојата на кожата (посветла боја на кожата) и косата, затнување на излезните канали на потните жлезди и инфекција на кожата.

Ретки несакани дејства (се јавуваат кај 1 на 000 болни)
Инсуфициенција на надбубрежната жлезда.

Пријавување на несаканите дејства

Ако забележите какво било несакано дејство, треба да го известите Вашиот лекар или фармацевт. Тоа го вклучува и секое можно несакано дејство кое не е наведено во ова упатство.

Со пријавување на несакани дејства можете да допринесете за процената на безбедноста на овој лек.

6. Чување на лекот БЕЛОСАЛИК лосион


Лекот треба да се чува на места недостапни за деца!

Да се чува на температура под 25 °C.

Рок на употреба

Назначен е на пакувањето.

Лекот не смее да се употребува по истекот на рокот на употреба!



Лековите не смеат да се отстрануваат преку домашните отпадни води или домашен отпад. Прашајте го Вашиот фармацевт како да ги отстранувате лековите кои повеќе не ви се потребни. Таквите мерки помагаат да ја зачуваме животна средина.

Начин на издавање на лекот

Лекот се издава во аптека само на рецепт (P).

Датум на последна ревизија на внатрешното упатство

Внатрешното упатство е одобрено на

