

Корлан® 0,25 мг таблета / Корлан 0,25 мг таблета
дигоксин

Пред употреба на лекот внимателно прочитај го упатството

- Чувайте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Ако имате дополнителни прашања, обратете се кај Вашиот доктор или фармацевт
- Овој лек Ви е препишан Вам лично и не треба да им го давате на други лица, бидејќи може да им настапат дури и ако нивните симптоми се исти како Вашиите

Внатрешното упатство содржи:

1. Што претставува лекот Корлан и за што се употребува
2. Што мора да знаете, пред да го земете/употребете лекот Корлан
3. Како да го земете / употребете лекот Корлан
4. Можни несакани дејства (ефекти)
5. Чување и рок на употреба на лекот Корлан

1. Што претставува лекот Корлан и за што се употребува

Една Корлан таблета содржи 0,25 мг (250 микрограми) активна материја дигоксин. Таблетите се бели или скоро бели, округли, биконвексни, со втиснат знак **ПЛИВА на едната страна**.

Во Корлан таблетите се содржат и некои помошни материји. Тоа се: лактоза, повидон, микрокристална целулоза, натриум скроб гликолат, колоиден безводен силициум диоксид, магнезиум стеарат.

Корлан таблетите се достапни во пакување од по 20 таблети; 2 блистера ц 10 таблети во кутија.

Фармакотерапевтска група:

Корлан припаѓа на група лекови кои се нарекуваат лекови со дејство на срцето; срцеви гликозиди; гликозиди на дигиталис.

Име и адреса на носителот на производителот:

ПЛИВА ХРВАТСКА д.о.о.

Прилаз баруна Филиповиќа 25,
10 000 Загреб, Хрватска

Име и адреса на носителот на одобрението за промет:



ПЛИВА Д.О.О.Е.Л-СКОПЈЕ
Никола Парапунов бб
СКОПЈЕ-МАКЕДОНИЈА

За што се употребува Корлан

Групата лекови наречени гликозиди на дигиталис, се употребува за лекување на одредени болести на срцето, како срцева слабост и одредени неправилности на ритамот на срцето.

Акутна и хронична срцева слабост.

Суправентрикуларни аритмии (атријална фибрилација, атријална ундулација, пароксизмална суправентрикуларна тахкардија).

2. Што треба да знаете пред да го земете/употребете лекот Корлан

Дигоксин е активна материја на таблетите Корлан, припаѓа на групата лекови гликозиди на дигиталис, а се употребуваат за лекување на одредени болести на срцето, како што се слабост на срцето и одредени неправилности на срцевиот ритам.

Ланикор таблетите се употребуваат за лекување на:

- акутна и хронична слабост на срцето.



- суправентрикуларни аритмии (ундулација и фибрилација на атриумите, пароксизмална суправентрикуларна тахикардија(ундулација и фибрилација на атриумите, пароксизмална суправентрикуларна тахикардија).

Не земајте Корлан таблети:

- Доколку сте пречувствителни на дигоксин, останати гликозиди на дигиталис или на некоја помошна материја.
- Некои антибиотици (тетрациклини, макролиди, рифампицин).
- Лекови кои се употребуваат за лекување на епилепсии (фенитоин, фенобарбитал).
- Лекови кои се употребуваат за лекување на висок крвен притисок (хипертензија).
- Лекови кои помагаат во излачување на телесни течности (диуретици).
- Кортикостероиди и амфотерицин (против габичен лек).

Известете го Вашиот лекар или фармацевт доколку земате или во скоро време сте земале други лекови, вклучително и тие кои можат да се купат без рецепт.

Бременост и доене

Пред да земете лек советувајте се со лекар или фармацевт.

Употребата на Корлан треба да се одбегнува во тек на бременост и доене.

Управување со возила и машини

Нема податоци за влијание на Корлан таблетите врз способноста за управување со возила и работа со машини.

Важни информации за некои компоненти на **Корлан** таблетите

- Овој лек содржи лактоза . Доколку лекарот Ви рекол дека имате болест на неподнесување на некои шекери, пред да почнете со земање на овој лек посоветувајте се со својот лекар.

3. Како да се зема/употребува лекот Корлан

Дозата на Корлан зависи од возрастта, телесната тежина и работата на бубрезите. Корлан се зема во две фази:

- Почетна доза (доза на заситување)
- Втора доза(доза на одржување)

Подолу се наведени вообичаените дози:

Возрасни

- Брза дигитализација се спроведува само кај пациенти кои не примале дигиталис гликозиди во текот на претходните две недели. За брза перорална дигитализација се дава почетна доза од 0,5 - 0,75 мг, а дополнителни дози од 0,25 мг се даваат секои 6-8 часа ако е потребно и ако пациентот ги поднесува, се додека саканиот ефект не стане клинички евидентен. Просечната доза за време на почетниот 24-часовен период изнесува 1 – 1.5 мг.
- Бавна дигитализација се постигнува со перорални дози од 0,125-0,5 мг дневно.
- Кај пациенти со нормална функција на бубрезите “стеадс стате” концентрации во плазмата се постигнуваат за околу 7 дена.
- Вообичаена доза на одржување е 0,25 мг на ден.
- *Деца*
- *Перорална ударна доза:*

Возрасна група	мг/кг/ден
предвреме родени бебиња и новороденчиња	0,02-0,035
1 месец – 2 години	0,035-0,06
2 – 5 години	0,03-0,04
5 – 10 години	0,02 – 0,035
> 10 години	0,01-0,015

- Пероралните ударни дози се даваат поделени во 3 или 4 дози, во интервали од 6 до 8 часа.
- Дозата на одржување е 25-35 % од пероралната ударна доза (кај предвреме родените бебиња 20-30 %).
- Таблетите се попогодни за деца постари од 2 години.
- *Дозирање кај пациенти со оштетена бubreжна функција*
- Кај пациенти со оштетена функција на бубрезите дозата треба да се прилагоди во зависност од сериозноста на оштетувањето и треба внимателно да се титрира.



[Handwritten signature]

Ниво на креатинин во серумот	Клиренс на креатининот	Доза
<1,2 мг/100 мл (106 µмол/л)	>70 мл/100 мин	вообичаена доза
<2,0 мг/100 мл (176 µмол/л)	>45 мл/100 мин	1/2 од дозата
<3,0 мг/100 мл (264 µмол/л)	>30 мл/100 мин	1/3 од дозата
>3,0 мг/100 мл (264 µмол/л)	<30 мл/100 мин	1/4 од дозата

Доза на одржување:

Во зависност од одговорот на детето на лекот, лекарот ќе ја одреди дозата на одржување која е најприфатлива за него, а која веројатно ќе изнесува петина или четвртина од почетната доза.

Што се прави доколку се предозирате со Корлан?

- Доколку по грешка земете повеќе таблети, Веднаш јавете се кај лекар/оддел за итна медицинска помош во најблиската болница. Немојте да заборавите да понесете со себе амбалажа на лекот и сите преостанати таблети.

Доколку заборавите да ја земете својата доза од лекот, земете ја во тој момент без да ја удвојувајте дозата.

4. Можни несакани дејства (ефекти)

Како и сите други лекови Корлан таблетите можат да предизвикаат неаскани дејства.

Чести несакани дејства (може да се јават кај повеќе од 1 од 100 болни, но помалку од 1 на 10 болни)

- Забавен пулс (брадикардија).
- Нарушување на видот.
- Мачнина, пролив, повраќање.
- Зголемување на градите кај мажи (гинекомастија).
- Алергиски кожни реакции (осип на кожата, уртикарција со јадеж).

Многу ретки несакани дејства (може да се јават кај помалку од 1 на 10000 болни)

- Конфузност, депресија, безволност.
- Губење на апетит (анорексија)
- Слабост.
- Збрзан пулс (тахикардија).

Несакани дејства чија зачестеност не може да се утврди од достапните податоци

- Намалување на број-от на одредени крвни клетки (тромбоцити, еозинофили).
- Одредени нарушувања на срцевиот ритам.
- Болка во stomакот.
- Губење на апетит и тежина.
- Оштетување на функцијата на бубрезите.

Доколку приметите билокакво несакано дејство потребно е да го известите лекарот или фармацевтот.

5. Чување на лекот Корлан

“Лекот чувајте го на места недостапни за деца”

Да се чува на температура до 25 °C.

Рок на употреба

Лекот не смее да се употребува по датумот на истекот на рокот на употреба што е наведен на кутијата.

Начин на издавање

“Лекот се издава во аптека само врз основа на рецепт”

Број на одобрението за ставањето на лекот во промет

Датум на последна ревизија на внатрешното упатство



Kfj