

Gastal 450 mg/300 mg таблетки

aluminium hydroxide-magnesium carbonate, magnesium hydroxide

- Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Советувајте се со Вашиот фармацевт или лекар ако Ви се потребни дополнителни информации.
- Ако забележите какво било несакано дејство, треба да го известите Вашиот лекар или фармацевт. Тоа го вклучува и секое можно несакано дејство кое не е наведено во ова упатство. Видете дел 4.
- Обавезно појдете на лекар ако не се чувствувате подобро, или ако се чувствувате полошо по 6 дена.

1. Што претставува Гастал и за што се употребува?
2. Што мора да знаете пред да почнете да употребувате Гастал?
3. Како да употребувате Гастал?
4. Можни несакани дејства
5. Чување и рок на употреба на Гастал
6. Дополнителни информации

Желудочната киселина е потребна во процесот на варење но, доколку се излучува прекумерно, може да предизвика разни непријатни симптоми во дигестивниот систем. Гастал се користи за краткотрајно ублажување на симптомите на зголемена киселост во желудникот и желудочните тегоби предизвикани од зголемената киселост (на пр., жиговина). Овој лек е наменет за лекување на возрасни и деца постари од 12 години.

2. ШТО МОРА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА ПОЧНЕТЕ ДА УПОТРЕБУВАТЕ ГАСТАЛ?



Не употребувајте Гастал:

- ако боледувате од тешка болест на бубрезите (затајување),
- ако сте преосетливи на соли на алуминиум и магнезиум или на некоја друга состојка на овој лек (наведени во дел 6.),
- ако имате хипофосфатемија (намалена концентрација на фосфати во крвта).

Предупредувања и мерки на претпазливост

Овој лек не смее непрекинато да се употребува подолго од 6 дена без советување со лекар.

Доколку симптомите се јавуваат повремено и постои потреба за почеста примена на лекот, потребно е да побарате совет од лекар. Откако ќе испиете една кутија од овој лек, немојте да земате друга кутија без советување со лекар или фармацевт. Продолжената примена на антациди може да ги прикрие симптомите на некои сериозни состојби, како карцином во гастроинтестиналниот систем.

Обратете се кај Вашиот лекар или фармацевт пред да земете Гастал:

- ако имате значително намалена телесна маса,
- ако имате оштетена функција на бубрезите,
- ако сте бремена или доите,
- ако сте на диета со ограничен внес на фосфати.
- доколку лекарот ви рекол дека имате болест на неподносливост на некои шеќери.

Деца

Овој лек не е наменет за употреба кај деца помлади од 12 години.

Употребата на магнезиум хидроксид кај мали деца може да предизвика хипермагнезмија, посебно кај деца со оштетена бубрежна функција или дехидратација.

Други лекови и Гастал

Секогаш, известете го Вашиот лекар или фармацевт ако земате, неодамна сте земале или би можеле да земате кој било друг лек, вклучувајќи ги и лековите кои се издаваат без лекарски рецепт.

Магнезиум хидроксид може да влијае врз дејството на некои лекови или тие може да влијаат врз дејството на магнезиум хидроксид. Известете го Вашиот лекар или фармацевт ако земате салицилати.

Овој лек може да го зголеми или намали дејството на другите истовремено употребувани лекови.

Тоа особено се однесува на лекови за:

- лекување на нарушен крвен притисок и работа на срцето (на пр. метопролол, дигоксин),



- лекување на анемија (на пр. препарати со железо),
- лекување на зголемена киселост во желудникот (на пр. ранитидин),
- лекување на маларија (на пр. хлорокин),
- лекување на болести на коските (на пр. бифосфонати),
- лекување на болести на бубрезите (на пр. цитрати),
- лекување на туберкулоза (на пр. изонијазид, рифампицин),
- лекување на разни инфекции (на пр. флуорокинолони, тетрациклински антибиотици, кетоконазол, рифампицин),
- лекување на воспаление и болки со нестероидни лекови (напроксен, ацетилсалицилна киселина), витамини, флуориди,
- лекување на Паркинсонова болест (на пр. леводопа),
- лекување на психички нарушувања (на пр. хлорпромазин),
- лекување болести на штитната жлезда (на пр. левотироксин),
- лекување на зголемени масти во крвта (на пр. росувастатин).

Овие лекови треба да се земаат најмалку 2 часа после или 1 час пред земање на Гастал.

Општа препорака е другите лекови да не се земаат истовремено со Гастал или да се земаат најмалку 1 час пред или по употребата на Гастал.

Гастал со храна

Овој лек најдобро е да се земе приближно еден час после оброкот и навечер пред спиење.

При жиговина можете да земете ист број на таблети, без оглед на оброкот.

Бременост, доење и плодност

Советувајте се со Вашиот лекар или фармацевт пред да земете било каков лек!

Доколку сте бремена или доите, мислите дека би можело да забремените или планирате да забремените, советувајте се со Вашиот лекар или фармацевт пред да почнете да го употребувате овој лек.

Гастал смее да се применува за време на бременоста и доењето само доколку е неопходно и во согласност со препораките на лекарот.

Управување со моторни возила и ракување со машини

Овој лек не влијае на способноста за управување со моторни возила и ракување со машини.

Важни податоци за некои помошни супстанции во Гастал таблети



Гастал содржи лактоза хидрат и сорбитол. Ако Вашиот лекар Ви кажал дека неподнесувате некои шеќери, посоветувајте се со Вашиот лекар пред да го употребите овој лек.

3. КАКО ДА УПОТРЕБУВАТЕ ГАСТАЛ?

Секогаш земајте го Гастал точно како што е наведено во ова упатство или како што Ви кажал Вашиот лекар или фармацевт. Доколку не сте сигурни како да го земате лекот, повторно проверете со Вашиот лекар или фармацевт.

- Препорачана доза е од 1 до 2 Гастал таблети, четири до шест пати на ден, освен ако Вашиот лекар не Ви одредил поинаку.
- Во тек на 24 часа, не смеете да земете повеќе од 8 таблети.
- Гастал најдобро е да се земе приближно еден час по оброк и навечер, пред спиење.
- При жиговина, може да земете ист број на таблети, без оглед на оброкот.
- Гастал таблетите немојте да ги гризете или голтате цели, туку пополека растопете ги во устата.
- Ако земате други лекови, се препорачува тие да се земат најмалку 1 час пред или после земање на антацидот (погледнете дел 2 „Други лекови и Гастал“).
- Гастал не смее непрекинато да се зема подолго од 6 дена без советување со лекар.

Примена кај деца и адолесценти

Деца на возраст од 12 години смеат да земат иста доза како за возрасни но, се препорачуваат помали дози и за време на пократок период.

Ако земете повеќе Гастал таблети отколку што е потребно

Во случај на предозирање или доколку случајно сте употребиле поголеми количини од лекот, веднаш јавете се на Вашиот лекар, фармацевт или одете во најблиската здравствена установа. Ве молиме понесете го преостанатиот лек или пакувањето. Мозни симптоми на предозирање се: запек, пролив, болки во стомакот, повраќање.

Ако сте заборавиле да го земете лекот Гастал

Не земајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената доза.



Ако имате какви било прашања во врска со употребата на лекот, обратете се кај Вашиот лекар или фармацевт.

4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА

Како и сите други лекови и овој лек може да предизвика несакани дејства, иако тие не се јавуваат кај сите пациенти.

Овој лек генерално добро се поднесува. При земање на таблети во препорачаните дози, ретко може да се јават несакани дејства.

Следниве несакани дејства се забележани при употреба на Гастал:

Многу ретко (може да се јават кај помалку од 1 на 10 000 лица):

- Алергиски реакции (чешање, исип, оток на очните капаци, лицето, усните или јазикот, потешкотии при дишење или голтање),
- Зголемена количина на магнезиум во телото (хипермагнезмија). Хипермагнезмија е забележана после долготрајна употреба кај пациенти со оштетена функција на бубрезите.

Непознато (зачестеноста не може да се процени според достапните податоци):

- мачнина, пролив, запек, болка во stomакот,
- намалена количина на фосфати во телото (хипофосфатемија),
- зголемени количини на алуминиум во телото (хипералуминемија).

Пријавување на несакани дејства

Ако забележите какви било несакани дејства, Ве молиме да го информирате Вашиот лекар, фармацевт или медицинска сестра. Тука спаѓаат и несаканите дејства кои не се наведени во ова упатство.

Со пријавување на несаканите дејства се обезбедува континуирано следење на користа наспроти ризикот од употребата на лекот и се обезбедуваат информации за безбедноста на лекот. Несаканите реакции од лековите може да ги пријавите во Националниот центар за фармаковигиланца при Агенцијата за лекови и медицински средства (ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 кат 1) или по електронски пат преку веб-страницата на Агенцијата <http://malmed.gov.mk/>.

5. ЧУВАЊЕ И РОК НА УПОТРЕБА НА ГАСТАЛ ТАБЛЕТИ

Лекот чувајте го на места недостапни за деца!

Гастал треба да се чувана температура до 25°C.

Лекот не смее да се употребува по датумот на истекот на рокот на употреба што е наведен на пакувањето. Датумот на истекот на рокот се однесува на последниот ден од тој месец.

Лековите не треба да се фрлаат во отпадна вода ниту во смет од домаќинството. Прашајте го Вашиот фармацевт како да ги отстраните лековите кои повеќе не Ви се потребни. Овие мерки ќе помогнат да се заштити околината.



6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Што содржи Гастал?

Активни супстанции се:

- алуминиум хидроксид - магнезиум карбонат гел (450 mg) и магнезиум хидроксид (300 mg).

Помошни супстанции се:

- манитол, сорбитол, лактоза хидрат, пченкарен скроб, натриум цикламат, сахарин натриум, талк, магнезиум стеарат, арома: пеперминт. Секоја таблета содржи 50 mg сорбитол, 30 mg лактоза хидрат.

Како изгледа и што содржи пакувањето на Гастал?

Гастал таблети се бели, округли таблети со мазни површини и закосени рабови. Гастал е достапен во пакување од 24 таблети во блистер (PVC/Al), во кутија.

Назив, седиште и адреса на носителот на одобрието за ставање во промет

ПЛИВА ДООЕЛ Скопје
ул. Наум Наумовски – Борче, бр. 40,
1000 Скопје
Р.Северна Македонија

Назив, седиште и адреса на производителот на лекот

PLIVA HRVATSKA d.o.o
Prilaz baruna Filipovica 25,
10 000 Zagreb Хрватска

Начин на издавање

Лекот може да се издава само во аптека и без рецепт (БР).

Датум на последна ревизија на внатрешното упатство

Декември 2024 година

Број на одобрение за ставање на лек во промет

11-252/3

