

УПАТСТВО ЗА ПАЦИЕНТОТ

НЕРАТНРОМБИН / ХЕПАТРОМБИН гел heparin

Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го упатството.

- Овој лек е достапен без рецепти, се применува за отстранување на симптомите на болеста без помош од страна на Вашиот доктор.
- Лекот треба внимателно да го користите за да добиете најдобри резултати од терапијата.
- Чувајте го уникатно. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Ако имате доволни прашања, обрнете се кај Вашиот доктор или фармацевт.
- Доколку симптомите на Вашата болест се влошат мора веднаш да го информирате Вашиот доктор.
- Ако забележите сериозно несакано дејство или било кое несакано дејство кое не е наведено во ова уникатно, Ве молиме кажете му на Вашиот доктор.

Упатството содржи:

1. Што претставува лекот Нератромбин гел и за што се употребува
2. Што треба да знаете, пред да го употребите лекот Нератромбин гел
3. Како да го употребите лекот Нератромбин гел
4. Можни несакани дејства на лекот Нератромбин гел
5. Чување и рок на употреба на лекот
6. Доволни информации

Нератромбин гел

Активна супстанција:

Нератромбин гел 300 I.E./1 g

1 g гел содржи:

хепарин натриум 300 I.E.

Нератромбин гел 500 I.E./1 g

1 g гел содржи:

хепарин натриум 500 I.E.

Помошни супстанции: алантоин, декспантенол, карбомер 940, левоментол, динатриум-едетат, масло од црн бор, масло од бел бор, етерско масло од лимон, сорбитол 70%, некрстализиран, изопропил алкохол, софтиген 767, триетаноламин, полисорбат 80, пречистена вода.

Пакување

Алуминиумска туба која содржи 40 g гел (300 I.E./1 g гел).

Алуминиумска туба која содржи 40 g гел (500 I.E./1 g гел).

Носител на одобрението за промет во Република Македонија

ХЕМОФАРМ А.Д. ФАРМАЦЕВТСКО - ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА
ПРЕТСТАВНИШТВО Скопје, ул. Јадранска Магистрала бр.31, Скопје, Р.
Македонија



Производител:

HEMOFARM A.D., ул. Београдски пут бб, Вршац, Р. Србија

Место на производство

HEMOFARM A.D. Вршац, огранок погон Шабац, ул. Хајдук Вељкова бб, Шабац, Р. Србија

1. ШТО ПРЕТСТАВУВА ЛЕКОТ HEPATHROMBIN ГЕЛ И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА

Hepathrombin гел 300 I.E./1 g и Hepathrombin гел 500 I.E./1 g се препарати на природен хепарин во форма на гел. Овој препарат покрај хепарин во својот состав содржи и алантоин, декспантенол и етерски масла. Хепатромбинот се користи во терапијата на болести на вените како: тромбофлебит (воспаление на вените кое настанува заради процес на тромбоза), проширени вени и кожни промени кои се јавуваат како последица на оваа состојба, *ulcus cruris* (отворени рани на кожата од подколеницата, кои се јавуваат заради лоша венска циркулација). Препаратот може да се употребува и при спортски повреди како и при бурзитис и тендовагинитис (воспаление на обвивките на тетивите).

Хепатромбинот ја спречува коагулацијата (згрушувањето) на крвта, а со тоа и создавањето на тромбови (тромбоза) во крвните садови. Хепаринот брзо се ресорбира преку кожата и има исклучително локално дејство. Помошните супстанции во препаратот (алантоин и декспантенол) овозможуваат брза ресорпција на хепаринот во кожата со што го засилуваат неговото дејство. Покрај ова дејство, овие помошни супстанции ја забрзуваат регенерацијата (обновувањето) на ткивата, зарастувањето на оштетената кожа и имаат против воспалително дејство. Hepathrombin гел содржи етерски масла кои имаат антисептично дејство, а заедно со високата концентрација на вода во препаратот, создаваат пријатно чувство на ладење и олеснување на симптомите.

2. ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА ГО УПОТРЕБИТЕ ЛЕКОТ HEPATHROMBIN ГЕЛ

Предупредејте го Вашиот доктор ако земајте други лекови, имате некоја хронична болест, некое поремејвање на метаболизмот, преосетливи сите на некои лекови или сите имале алергиска реакција на некои од нив.

Кога да не употребувате Hepathrombin гел

Немојте да го земате овој лек во следните случаи:

- ако сте преосетливи (алергични) на хепарин или на некоја од помошните состојки на лекот;
- ако имате *ulcus cruris* кој крвари;
- ако имате отворени и/или инфицирани рани;
- лекот не се користи кај деца помали од 5 години.

Бидете посебно претпазливи ако го употребувате Hepathrombin гел

При употреба на гелот во терапија на воспаление на вените, лекот не смее да се втрие во кожата туку се наносува на болното место во слој со дебелина на тапата страна од нож и се покрива со еластичен или оклузивен завој (видете дел - Како се употребува лекот Hepathrombin гел).

Употреба со храна и пијалоци

Храната и безалкохолните пијалоци немаат значајно влијание врз дејството на лекот.

Бременост и доење

Советувајте се со Вашиот доктор или фармацевт пред да земете било каков лек. Непатромбин гел може да се употребува за време на бременост и доење.

Влијание врз способноста за возење на автомобил или ракување со машини

Непатромбин гел не влијае врз менталните и/или физичките способности при возење автомобил и работа со машини.

Супстанции со посебно дејство

Нема значајни податоци за помошните супстанции на лекот.

Употреба на други лекови

Овие информации се однесуваат и на лекови кои сите ги примале во минатото како и на лекови кои планирате да ги земете во иднина. Ве молиме да го информирате Вашиот доктор или фармацевт ако земате, или ако до неодамна сите земале било кој друг лек, дури и оние кои не се на лекарски рецепти. Ова е од голема важност бидејќи истовремената терапија со повеќе лекови може да го ослаби или засили нивното дејство.

Ако користите некој препарат кој се аплицира на кожа, пред да почнете да го употребувате Непатромбин гел советувајте се со Вашиот доктор.

3. КАКО ДА ГО УПОТРЕБУВАТЕ ЛЕКОТ НЕПАТРОМБИН ГЕЛ

Терапијата се почнува со препаратот Непатромбин 500 I.E./1 g, а покасно во третманот и за превенција се користи Непатромбин 300 I.E./1 g.

Гелот се аплицира на болното место и на околниот дел од кожата во тенок слој 2-4 пати на ден и потоа нежно се втријува. Кога гелот се употребува во терапија на воспаление на вените, лекот не смее да се втрие во кожата туку во слој со дебелина на тапата страна од нож се нанесува на болното место и се покрива со еластичен или оклузивен завој. Непатромбин гел може да се нанесува само на неоштетена кожа. За третман на варикозни улцерации (отворени рани на кожата од подколеницата кои се јавуваат заради лоша венска циркулација) се користи Непатромбин крем.

Ако Вашите симптоми се влошат, веднаш информирајте го Вашиот доктор.

Ако сте земале поголема доза од лекот отколку што е потребно

Ако сите земале поголема доза од лекој отколку што треба, или ако некој друг случајно го зел Вашиот лек треба веднаш да се консултирате со Вашиот доктор или фармацевт или да се обратите во најблиската здравствена институција.

Ако сте заборавиле да го земете лекот

Никога не земајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената доза!


Ако сте заборавиле да го земете лекот на време, не земајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената доза. Продолжете со терапијата и земете ја наредната доза во планираниот термин.

Ако прекинете да го земете лекот

Нема да Ви се јават промени доколу нагло ја прекинете терапијата со препаратот Непатромбин гел.

4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА НА ЛЕКОТ НЕПАТРОМБИН ГЕЛ

Непатромбин гел добро се поднесува од страна на организмот меѓутоа како и сите лекови кај некои пациенти може да дојде до појава на несакани дејства.



JL

Многу ретко може да се јават алергиски реакции (реакции на преосетливост) на кожата. Може да дојде до појава на црвенило, пецкање и чешање на местото на апликација.

Ако забележите појава на несакано дејство кое илшо не йоминува или Ве вознемирува, веднаш обраќајте се кај Вашиот доктор.

Ако забележите појава на несакано дејство кое илшо не е наведено во внатрешното упатство обраќајте се кај Вашиот доктор или фармацевт.

5. ЧУВАЊЕ НА ЛЕКОТ

Да се чува подалеку од дофат на деца!

Чувајте го лекот на температура до 25°C.

Рок на употреба

3 години.

Лекоит не смее да се употребува после истекоит на датумот на употреба илшо е наведен на пакувањето. Датумот на употреба се однесува на последниот ден од наведениот месец.

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Начин на издавање

Лекот може да се издава и без лекарски рецепт.

Број и датум на одобрението за ставање во промет

Датум на последна ревизија на внатрешното упатство



JL