

Yml

УПАТСТВО ЗА ПАЦИЕНТОТ

HERATHROMBIN / ХЕПАТРОМБИН крем heparin

Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го упатството.

- Овој лек е достапен без рецепти, се применува за отстранување на симптомите на болеста без помош од страна на Вашиот доктор.
- Лекот треба внимателно да го користите за да добиете најдобри резултати од терапијата.
- Чувајте го уапсливо. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Ако имате доволни телесни прашања, обрнете се кај Вашиот доктор или фармацевт.
- Доколку симптомите на Вашата болест се влошат мора веднаш да го информирате Вашиот доктор.
- Ако забележите сериозно несакано дејство или било кое несакано дејство кое не е наведено во ова упатство, Ве молиме кажете му на Вашиот доктор.

Упатството содржи:

1. Што претставува лекот Herathrombin крем и за што се употребува
2. Што треба да знаете, пред да го употребите лекот Herathrombin крем
3. Како да го употребите лекот Herathrombin крем
4. Можни несакани дејства на лекот Herathrombin крем
5. Чување и рок на употреба на лекот
6. Доволни телесни информации

Herathrombin крем

Активна супстанција:

Herathrombin крем 300 I.E./1 g

1 g крем содржи:

хепарин натриум 300 I.E.

Herathrombin крем 500 I.E./1 g

1 g крем содржи:

хепарин натриум 500 I.E.

Помошни супстанции: алантоин, декспантенол, бронопол, карбомер 934, Lunasera M, левоментол, Hostafat KW-340-N, парафин, течен, лесен, пурцелинол, тегин 515, динатриум едетат, триетаноламин, бел вазелин, пречистена вода.

Пакување

Алуминиумска туба која содржи 40 g крем (300 I.E./1 g крем).

Алуминиумска туба која содржи 40 g крем (500 I.E./1 g крем).

Носител на одобрението ставање во промет во Република Македонија

ХЕМОФАРМ А.Д. ФАРМАЦЕВТСКО - ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА
ПРЕТСТАВНИШТВО Скопје, ул. Јадранска Магистрала бр.31, Скопје, Р.
Македонија

Производител:

HEMOFARM A.D., ул. Београдски пут бб, Вршац, Р. Србија



Yml

Место на производство

НЕМОФАРМ А.Д. Вршац, огранок погон Шабац, ул. Хајдук Вељкова бб, Шабац, Р.Србија

1. ШТО ПРЕТСТАВУВА НЕРАТНROMBIN КРЕМ И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА

Нерathrombin крем 300 I.E./1 g и Нерathrombin крем 500 I.E./1 g се препарати на природен хепарин во форма на крем. Овој препарат покрај хепарин во својот состав содржи и алантоин и декспантенол. Хепатромбинот се користи во терапијата на болести на вените како: тромбофлебит (воспаление на вените кое настанува заради процес на тромбоза), проширени вени и кожни промени кои се јавуваат како последица на оваа состојба, *ulcus cruris* (отворени рани на кожата од подколеницата, кои се јавуваат заради лоша венска циркулација). Препаратот може да се употребува и при спортски повреди како и при бурзитис и тендовагинитис (воспаление на обвивките на тетивите).

Хепатромбинот ја спречува коагулацијата (згрушувањето) на крвта, а со тоа и создавањето на тромбови (тромбоза) во крвните садови. Хепаринот брзо се ресорбира преку кожата и има исклучително локално дејство. Помошните супстанции во препаратот (алантоин и декспантенол) овозможуваат брза ресорпција на хепаринот во кожата со што го засилуваат неговото дејство. Покрај ова дејство, овие помошни супстанции ја забрзуваат регенерацијата (обновувањето) на оштетената кожа, зарастувањето и имаат против-воспалително дејство.

2. ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА ГО УПОТРЕБИТЕ ЛЕКОТ НЕРАТНROMBIN КРЕМ

Предупредете го Вашиот доктор ако земате други лекови, имате некоја хронична болест, некое пореметување на метаболизмот, преосетливи сте на некои лекови или сте имале алергиска реакција на некои од нив.

Кога да не употребувате Нерathrombin крем

Немојте да го земате овој лек во следните случаи:

- ако сте преосетливи (алергични) на хепарин или на некоја од помошните состојки на лекот;
- ако имате *ulcus cruris* кој крвари;
- ако имате отворени и/или инфицирани рани;
- лекот не се користи кај деца помали од 5 години.

Бидете посебно претпазливи ако го употребувате Нерathrombin крем

При употреба на кремот во терапија на воспаление на вените, лекот не смее да се втрие во кожата туку се наноси на болното место во слој со дебелина на тапата страна од нож и се покрива со еластичен или оклузивен завој (видете дел - Како се употребува лекот Нерathrombin крем).

Употреба со храна и пијалоци

Храната и безалкохолните пијалоци немаат значајно влијание врз дејството на лекот.

Бременост и доене

Советувајте се со Вашиот доктор или фармацевт пред да земете било каков лек. Нерathrombin крем може да се употребува за време на бременост и доене.

Влијание врз способноста за возење на автомобил или ракување со машини



Нератромбин крем не влијае врз менталните и/или физичките способности при возење автомобил и работа со машини.

Супстанции со посебно дејство

Нератромбин крем ја содржи помошната супстанца бронепоп која може да предизвика локални реакции на кожата (на пр. контактен дерматитис).

Употреба на други лекови

Овие информации се однесуваат и на лекови кои сѐ ги примале во минатото како и на лекови кои планираат да ги земат во иднина. Ве молиме да го информирате Вашиот доктор или фармацевт ако земате, или ако до неодамна сѐ земале било кој друг лек, дури и оние кои не се на лекарски рецепти. Ова е од голема важност бидејќи истовремената терапија со повеќе лекови може да го ослаби или засили нивното дејство.

Ако користите некој препарат кој се аплицира на кожа, пред да почнете да го употребувате Нератромбин крем советувајте се со Вашиот доктор.

3. КАКО ДА ГО УПОТРЕБУВАТЕ ЛЕКОТ НЕРАТРОМБИН КРЕМ

Терапијата се почнува со препаратот Нератромбин 500 I.E./1 g, а покасно во третманот и за превенција се користи Нератромбин 300 I.E./1 g.

Кремот се аплицира на болното место и на околниот дел од кожата во тенок слој 2-4 пати на ден и потоа нежно се втријува. Кога кремот се употребува во терапија на воспаление на вените, лекот не смее да се втрие во кожата туку во слој со дебелина на тапата страна од нож се нанесува на болното место и се покрива со еластичен или оклузивен завој.

При третман на варикозни улцерации Нератромбин кремот се нанесува во форма на прстен со ширина од 4 cm.

Ако Вашите симптоми се влошат, веднаш информирајте го Вашиот доктор.

Ако сте земале поголема доза од лекот отколку што е потребно

Ако сѐ земале поголема доза од лекот отколку што треба, или ако некој друг случајно го зел Вашиот лек треба веднаш да се посоветувате со Вашиот доктор или фармацевт или да се обратите во најблиската здравствена институција.

Ако сте заборавиле да го земете лекот

Никога не земајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената доза!

Ако сте заборавиле да го земете лекот на време не земајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената доза. Продолжете со терапијата и земете ја наредната доза во планираниот термин.

Ако прекинете да го земете лекот:

Нема да Ви се јават промени доколку нагло ја прекинете терапијата со препаратот Нератромбин крем.

4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА НА ЛЕКОТ НЕРАТРОМБИН КРЕМ

Нератромбин крем добро се поднесува од страна на организмот меѓутоа како и сите лекови кај некои пациенти може да дојде до појава на несакани дејства.

Многу ретко може да се јават алергиски реакции (реакции на преосетливост) на кожата. Може да дојде до појава на црвенило, пецкање и чешање на местото на апликација.

Ако забележите појава на несакано дејство кое што не поминува или Ве вознемирува, веднаш обратете се кај Вашиот доктор.

Ако забележите појава на несакано дејство кое што не е наведено во внаштрешното упатство обратете се кај Вашиот доктор или фармацевт.



5. ЧУВАЊЕ НА ЛЕКОТ

Да се чува подалеку од дофат на деца!

Чувајте го лекот на температура до 25°C.

Рок на употреба

3 години.

Лекоот не смее да се употребува после истекоот на датумот на употреба што е наведен на пакувањето. Датумот на употреба се однесува на последниот ден од наведениот месец.

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Начин на издавање

Лекот може да се издава и без лекарски рецепт.

Број и датум на одобрението за промет:

Датум на последна ревизија на внатрешното упатство

Декември, 2015

