# УПАТСТВО ВО ПАКУВАЊЕТО/ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПАЦИЕНТОТ

**HEPATHROMBIN H ректална маст / ХЕПАТРОМБИН Х ректална маст**
**heparin/prednisolone/polidocanol**
**(65 I.E./2,233 mg/30 mg)/1 g**

**Пред употребата на лекот внимателно прочитајте го упатството бидејќи тоа содржи важни информации за Вас.**

- *Овој лек можете да го купите и без лекарски рецепт, за лекување на благи форми на болест без помош од Вашиот доктор.*
- *Внимателно користете го овој лек како би се постигнале најдобри резултати.*
- *Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.*
- *Ако имате дополнителни прашања, обратете се кај Вашиот доктор или фармацевт.*
- *Овој лек Ви е пропишан Вам лично и не треба да им го давате на други лица, бидејќи може да им наштети дури ако нивните симптоми се исти како Вашите.*
- *Ако Вашата состојба се влоши обавезно консултирајте се со Вашиот доктор.*
- *Овој лек не треба да го користите подолго од 7 дена.*

**Упатството содржи:**

*1 Што претставува Hepathrombin H, ректална маст и за што се употребува*
*2.Што мора да знаете, пред да го употребите лекот Hepathrombin H, ректална маст*
*3. Како да го употребувате лекот Hepathrombin H, ректална маст*
*4.Можни несакани дејства на лекот Hepathrombin H, ректална маст*
*5.Чување и рок на употреба на лекот Hepathrombin H, ректална маст*
*6.Дополнителни информации*

## 1. ШТО ПРЕТСТАВУВА HEPATHROMBIN H И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА

**Како делува HEPATHROMBIN H ?**

Лекот Hepathrombin H, ректална маст како активни супстанции содржи хепарин натриум, преднизолон и полидоканол. Оваа комбинација на лековити супстанции делува во аноректалната регија и ефикасно ги отстранува пратечките симптоми и последици на хемороидите (проширени вени) како што се јадеж, жарење, пецкање, болки и влажење. Hepathrombin H содржи чист хепарин и го спречува згрушувањето на крвта во хемороидите. Преднизолонот во составот на лекот делува антиинфламаторно (против-воспалително), а полидоканол манифестира локален анестетички и антипруригинозен ефект (го одстранува јадежот).

**Кога се употребува HEPATHROMBIN H?**

Лекот Hepathrombin H ректална маст се користи како краткотрајна симптоматска терапија на хемороиди и јадеж во перианалниот предел (подрачјето околу отворот на чмарот).

## 2. ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА ГО УПОТРЕБИТЕ ЛЕКОТ HEPATHROMBIN H

*Информирајте го Вашиот доктор ако имате некоја хронична болест, метаболно заболување, ако сте алергични на овој лек или на други лекови или ако користите други лекови.*

**Немојте да употребувате HEPATHROMBIN H ректална маст ако:**

- имате инфекција во перианалниот предел;
- имате склоност кон крварење;
- сте бремени или планирате бременост.

**Треба да сте посебно внимателни при употреба на Hepathrombin H и да го предупредите Вашиот доктор во следните случаи:**

Нема посебни предупредувања за примена на Hepathrombin H ректална маст. Сите информации за примената на овој лек видете ги во делот «Како се употребува *лекот Hepathrombin H*»?

**Употреба на Hepathrombin H со храна или со пијалок**

Не е значајно за овој лек.

**Бременост и доење**

*Советувајте се со Вашиот доктор или фармацевт пред да земете било каков лек.*

Лекот Hepathrombin H ректална маст не се препорачува за употреба за време на бременост. Hepathrombin H не смее да се употребува во рана бременост (видете го делот *Што треба да знаете пред да го употребите лекот Hepathrombin H?*). Лекот можете да го употребувате покасно во текот на бременоста (II и III триместер), но само кога е тоа неопходно, со превземање на посебни мерки на претпазливост и по претходна консултација со Вашиот доктор.

Во колку доите, можете да користите Hepathrombin H ректална маст само со превземање на посебни мерки на претпазливост и по претходна консултација со Вашиот доктор.

**Влијание врз способноста за возење на автомобил или ракување со машини**

Нема податоци дека Hepathrombin H може да влијае на психофизичките способности при управување на моторно возило или употреба на машини.

**Што треба да знаете во однос на помошните состојки кои ги содржи Hepathrombin H**

Поради присуство на ланолин може да се јават локални реакции на кожата (пример: контактен дерматитис).

**Употреба на други лекови**

*Ве молиме да го информирате Вашиот доктор или фармацевт ако земате, или ако до неодамна сте земале било кој друг лек, дури и оние кои не се на лекарски рецепт. Овие информации се многу важни бидејќи употребата на повеќе лекови во исто време може да го ослаби или појача нивното дејство.*
Не се препорачува истовремена примена на Hepathrombin H со други препарати кои се применуваат ректално.

## 3. КАКО ДА СЕ УПОТРЕБУВА ЛЕКОТ HEPATHROMBIN H

*Строго придржувајте се кон упатствата на докторот. Дозите не смеете да ги менувате или лекувањето да го прекинувате без да се посоветувате со Вашиот доктор. Ако сметате дека ефектот на лекот е премногу слаб или премногу силен, посоветувајте се со Вашиот доктор.*

**Дозирање**
При надворешни промени, Hepathrombin H ректална маст се нанесува на заболеното место 2 пати на ден, по дефекација. Првиот ден маста може да се аплицира и до 4 пати на ден со цел побрзо олеснување на симптомите.
При внатрешни хемороиди на тубата се прицврстува цевче кое потоа се вовлекува во завршетокот на дебелото црево и со лесен притисок на тубата се истиснува мала количина на маста.
Во лекувањето на внатрешни хемороиди може да се користат и Hepathrombin H супозитории кои се ставаат во ректумот, еднаш на ден, после дефекација. Кај пациенти со поизразени симптоми во текот на првиот ден од третманот може да се аплицира по една супозиторија, 2-3 пати на ден. Повеќе супозитории смее да се применат само во текот на првиот ден од третманот и само доколку постојат поизразени симптоми кај пациентот.

**Начин на употреба**
За лекување на надворешни промени, Hepathrombin H ректална маст се нанесува директно на заболеното место. При внатрешни хемороиди на тубата се прицврстува цевче кое потоа се вовлекува во завршетокот на дебелото црево и со лесен притисок на тубата се истиснува мала количина на маста.

**Ако сте зеле поголема доза од лекот отколку што е потребно:**
*Ако сте земале поголема доза од лекот отколку што треба, веднаш треба да се посоветувате со Вашиот доктор или фармацевт или обратете се до најблиската здравствена установа.*

**Ако сте заборавиле да земете Hepathrombin H:**
*Ако сте заборавиле да го земете лекот на време не се вознемирувајте. Земете го лекот веднаш штом ќе се сетите. Ако се наближува времето за земање на следната доза, изоставете ја пропуштената доза.*
*Не земајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената доза.*

**Ако нагло прекинете со употреба на Hepathrombin H**

*Не прекинувајте да го употребувате лекот без да се советувате со Вашиот доктор дури и ако забележите подобрување на Вашите симптоми.*

*Ако имате било какви дополнителни прашања во врска со лекот обратете се за совет кај Вашиот доктор или фармацевт.*

## 4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА НА ЛЕКОТ HEPATHROMBIN H

*Како и сите лекови, Hepathrombin H може да предизвика несакани дејства кај некои пациенти.*
Долготрајна примена може да доведе до успорено зараснување на рани на кожата.
Исклучително ретко можат да се јават алергиски реакции (реакции на преосетливост) и знаци на локална иритација.

*Ако забележите дека некое од несаканите дејства не се повлекува или Ве вознемирува, Ве молиме да го информирате Вашиот доктор или фармацевт.*
*Ако забележите било какви несакани дејства кои не се споменати во ова упатство, Ве молиме да го информирате Вашиот доктор или фармацевт.*

## 5. ЧУВАЊЕ НА ЛЕКОТ HEPATHROMBIN H

***Лекот да се чува на места недостапни за децата !***
Да се чува на температура до 25°C.

**Рок на употреба**
3 (три) години.
*Лекот не смее да се употребува по истекот на датумот на употреба што е наведен на пакувањето. Истекот на датумот на употреба е до последниот ден од месецот што е наведен на пакувањето.*
По првото отварање лекот треба да се чува во добро затворена туба до 28 дена на температура под 25°C.

Медицинските производи не треба да се одстрануваат со отпадната вода и домашното ѓубре. Прашајте го Вашиот фармацевт за совет како да ги отстраните лековите кои повеќе не Ви се потребни. Овие мерки придонесуваат да се заштити Вашата околина.

## 6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

**Што содржи HEPATHROMBIN H**
***Активна супстанција:*** хепарин-натриум, преднизолон ацетат и полидоканол.
***Помошни состојки:*** парафин, цврст; парафин, течен; ланолин безводен; силициум диоксид, колоиден, безводен.

**Како изгледа HEPATHROMBIN H и содржина на пакувањето**

Ректална маст (жолтеникаво бела, полупровидна, хомогена, маст слична со гел и со карактеристичен мирис).
Алуминиумска туба со пластичен затварач (полипропилен) со пластичен продолжеток (полиетилен со ниска густина) со капаче (полиетилен со висока густина).
Пакување: Една туба Hepathrombin H ректална маст содржи 20 g маст.

**Производител**
HEMOFARM A.D., ул. Београдски пут бб, Вршац, Р.Србија

**Место на производство**
HEMOFARM A.D. Вршац, огранок погон Шабац, ул. Хајдук Вељкова бб, Шабац, Р.Србија

**Носител на решението за промет**
ХЕМОФАРМ А.Д. ФАРМАЦЕВТСКО - ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА ПРЕТСТАВНИШТВО СКОПЈЕ
ул. Јадранска Магистрала бр.31, Скопје, Р.Македонија

**Број и датум на одобрението за ставање во промет**
15-5416/14 од 11.11.2014

**Датум на последна ревизија на упатството**
*Maj, 2015*