

PENTOKSIFILIN / ПЕНТОКСИФИЛИН

(pentoxifylline)

обложени таблети од 400 mg

Пред употребата на лекот внимателно прочитајте го упатството.

- Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно
- Ако имате дополнителни прашања, обратете се кај Вашиот доктор или фармацевт
- Овој лек Ви е препишан Вам лично и не треба да им го давате на други лица, бидејќи може да им наштети дури ако нивните симптоми се исти како Вашите

Активна супстанца во ПЕНТОКСИФИЛИН обложените таблети е пентоксифилин.

Една обложена таблета содржи 400 mg пентоксифилин.

Помошни супстанции: хидроксиетилцелулоза, коповидон, талк, магнезиум стеарат, сахароза, титан диоксид, макрогол 6000, акација, боја розова 85 E122.

Пакувања:

Број и датум на
решението за промет

Кутија со 20 обложени таблети од
400 mg (2 блистера)

Име и адреса на производителот и носител на одобрение за ставање во промет:

АД ЈАКА 80 Радовиш
Производна локација: "Првوماјска б.б." - Скопје
Република Македонија

1. Што претставува лекот ПЕНТОКСИФИЛИН и за што се употребува
ПЕНТОКСИФИЛИН е метилксантински дериват. Тој го подобрува протокот на крвта низ крвните садови при заболувања на крвните садови на периферијата и во централниот нервен систем. Со ова се подобрува снабденоста на ткивата со кислород при патолошки состојби кои се карактеризираат со намалена циркулација на крвта.



ПЕНТОКСИФИЛИН се употребува за:

- пореметување на периферната артериска циркулација и микроциркулација поради атеросклероза, дијабет - claudicatio intermitens, angiopathia diabetica, endangitis obliterans;
- дистрофични пореметувања (посттромботичен синдром, гангрена, промрзлини, ulcus cruris);
- ангионевропатии (поретко);
- намалување на субјективните симптоми при мозочните пореметувања во циркулацијата исхемични напади, последици на мозочната тромбоза, хронична церебрална инсуфициенција, како и при пореметувањата на циркулацијата на очите (акутни и хронични состојби на недоволна циркулација во мрежницата);
- нарушување на циркулацијата во внатрешното уво.

2. Што треба да знаете пред да го земете лекот ПЕНТОКСИФИЛИН

Немојте да го земате лекот ПЕНТОКСИФИЛИН:

- ако сте алергични на пентоксифилин или на други лекови кои припаѓаат на ксантинската група како: теофилинот, кофеинот, аминофилинот и теоброминот; или на некоја од помошните супстанции наведени во ова упатство;
- ако имате неодамна прележан инфаркт на миокардот;
- ако имате потешки облици на крварења;
- ако имате порфирија.

Бидете посебно внимателни со лекот ПЕНТОКСИФИЛИН:

- ако имате низок-или нестабилен крвен притисок,
- ако имате срцева слабост,
- ако имате оштетување на црниот дроб,
- ако имате оштетување на бубрезите,
- ако земате некој други лекови погледнете во делот **Земање на други лекови**.

Ве молиме да се посоветуваат со доктор и тогаш кога горенаведените укажувања се однесувале на Вас било кога во минатото.

Земање на лекот со храна или со пијалок
Обложените таблети се земаат по јадење.

Бременост и доење

Советувајте се со Вашиот доктор или фармацевт пред да земете било каков лек.



Влијание врз способноста за возење на автомобил или ракување со машини

ПЕНТОКСИФИЛИН може да предизвика намален крвен притисок и вртоглавица. Во овие случаи не е препорачливо возење на автомобили или ракување со машини.

Земање на други лекови (на што треба да се внимава ако употребувате други лекови)

Ве молиме да го информирате Вашиот доктор или фармацевт ако земате, или ако неодамна сте земале било кој друг лек, дури и оние кои не се на лекарски рецепт.

Ве молиме да имате во предвид дека овие укажувања можат да се однесуваат и на оние препарати кои што сте ги земале во минатото или ќе ги земате во иднина.

Особено е важно ако истовремено земате:

- циметидин,
- теофилин,
- варфарин,
- антихипертензивните лекови,
- антикоагулантни лекови.

3. Како да се зема лекот

Строго придржувајте се кон упатствата на докторот. Дозите не смеете да ги менувате или лекувањето да го прекинувате без да се посоветувате со доктор.

Лекот се дозира во зависност од заболувањето.

Во почетокот на лекувањето се препорачува 3 пати на ден по 1 обложена таблета од 400 mg. Дневни дози поголеми од 1200 mg немаат дополнителна тераписка вредност. Откако состојбата на болниот ќе се подобри, дозата се намалува на 2 пати на ден по 1 обложена таблета од 400 mg.

При поблаги облици на заболувања, доволна е дневна доза од 2 обложени таблети од 400 mg од почетокот на третманот.

Терапискиот ефект може да се очекува по 2-4 недели од почетокот на третманот, во одделни случаи лекувањето мора да трае до 8 недели.

Дозирање при бубрежна инсуфициенција:

Во случај на клиренс на креатинин под 10 ml/min.(0,16 ml/s) се администрира 50-70 % од вообичаената доза.

Кај пациенти на хемодијализа се препорачува да се започне со дневна доза од 400 mg, која може постепено да се зголемува (во интервали не помали од 4 дена) до вообичаената дневна доза.

Следете ги инструкциите освен ако Вашиот доктор не ви препорача поинаку.



Не заоравајте да го земете лекот.

Ако имате впечаток дека ефектот на лекот е премногу силен или премногу слаб, посоветувајте се со Вашиот доктор или фармацевт.

Ако сте земале поголема доза од лекот отколку што треба (предозирање):
Ако сте земале/употребиле поголема доза од лекот отколку што треба веднаш треба да се посоветувате со Вашиот доктор или фармацевт.

Ако сте заборавиле да го земете лекот ПЕНТОКСИФИЛИН:
Земете ја пропуштената доза колку што е можно побрзо.
Ако е речиси дојдено времето за земање на следната доза, почекајте додека да дојде времето за истата и земете ја, а прескокнете ја пропуштената доза.
Не земајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената доза

4. Можни несакани дејства

Како и сите лекови, ПЕНТОКСИФИЛИН може да има несакани дејства.

Ако се случи било што од долунаведеното, веднаш престанете со земањето на лекот и за истото веднаш известете го Вашиот доктор или одете во ургентното одделение во најблиската болница:

- Отекување на лице, усни или грло што може да предизвика тешкотии при голтањето или дишењето;
- исип/ егзантема, уртикарија.

Сите овие се многу сериозни несакани дејства. Во таков случај Ви е потребна итна медицинска помош или хоспитализација.

Сите овие многу сериозни несакани дејства се многу ретки.

Ако забележите некои од следниве симптоми, веднаш известете го вашиот доктор или одете во ургентното одделение во најблиската болница:

- треперење на некоја група мускули,
- црвенило на лицето,
- срцебиење,
- намален крвен притисок.

Сите овие се сериозни несакани дејства, за кои е потребна итна медицинска помош.

Сериозните несакани дејства се ретки.

Известете го Вашиот доктор ако забележите:

- мачнина,



- гадење,
- повраќање,
- вртоглавица,
- главоболка.

Сите овие се слаби несакани дејства.

Ако забележите било какви несакани дејства кои не се споменати во ова упатство, Ве молиме да го информирате Вашиот доктор или фармацевт.

5. Чување на лекот

Да се чува на температура до 25° C, заштитено од светлина.

ЛЕКОТ ЧУВАЈТЕ ГО НА МЕСТА НЕДОСТАПНИ ЗА ДЕЦА!

Рок на употреба

Лекот не смее да се употребува по датумот на истекот на рокот на употреба што е наведен на кутијата и на блистерот.

Начин на издавање на лекот

Лекот се издава само со рецепт.

Датум на последна ревизија на внатрешното упатство

Внатрешното упатство е одобрено на _____

Скопје, декември, 2011 г.

