

KOTRIMOKSAZOL / КОТРИМОКСАЗОЛ

(co-trimoxazole)

таблети од 480 mg

таблети од 120 mg

перорална суспензија 100 ml (240 mg/5 ml)

Пред употребата на лекот внимателно прочитајте го упатството.

- Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно
- Ако имате дополнителни прашања, обратете се кај Вашиот доктор или фармацевт
- Овој лек Ви е препишан Вам лично и не треба да им го давате на други лица, бидејќи може да им наштети дури ако нивните симптоми се исти како Вашите

Активни супстанции во КОТРИМОКСАЗОЛ таблетите и пероралната суспензијата се сулфаметоксазол и триметоприм.

Една таблета од 480 mg содржи 400 mg сулфаметоксазол и 80 mg триметоприм.

Една таблета од 120 mg содржи 100 mg сулфаметоксазол и 20 mg триметоприм.

Помошни супстанции во таблетите: лактоза монохидрат, повидон, докузат натриум (таблети од 120 mg), кроскармелоза натриум, магнезиум стеарат, натриум лаурил сулфат

5 ml перорална суспензија содржи 200 mg сулфаметоксазол и 40 mg триметоприм

Помошни супстанции во пероралната суспензија: сахароза, сорбитол, глицерол, пропилен гликол, метил парахидрокси бензоат, пропилен парахидрокси бензоат, лимонска киселина, натриум цитрат, етанол, микрокристална целулоза, ксантан гума, арома цреша, полисорбат 80, боја: розева Е 122, пречистена вода

Пакувања:

Број и датум на
решението за промет

Кутија со 20 таблети од 480 mg (2 блистери)

Кутија со 20 таблети од 120 mg (2 блистери)

Шише со 100 ml суспензија (240 mg/5 ml)

Име и адреса на производителот и носител на одобрение за ставање во промет:

АД ЈАКА 80 Радовиш

Производна локација: "Првوماјска" б.б.

Република Македонија



1. Што претставува лекот КОТРИМОКСАЗОЛ и за што се употребува
Котримоксазол е антибиотик кој се состои од две компоненти: сулфаметоксазол и триметоприм. Оваа комбинација се користи за третман на инфекции со разни микроорганизми. Котримоксазол се употребува за третман на: инфекции на уринарниот тракт (мочен меур, бубрези, мочни патишта), инфекции на органите за дишење, грлото, синусите, крајниците (тонзили), средото уво, инфекции на системот за варење (бактериска дизентерија, тифус, паратифус, колера), венерични и генитални инфекции (болести и инфекции на половите органи)

2. Што треба да знаете пред да го земете лекот КОТРИМОКСАЗОЛ

Немојте да го земате лекот КОТРИМОКСАЗОЛ:

- ако сте алергични на сулфаметоксазол, триметоприм или на некоја од помошните супстанции наведени во ова упатство,
- ако имате тешко оштетување на бубрежната или црнодробната функција,
- ако имате тешко пореметување на хематопоезискиот систем (систем одговорен за создавање на крвните клетки),
- ако сте бремена или доите,

Котримоксазол не се дава на недоносени и новороденчиња во првите два месеци од животот.

Бидете посебно внимателни со лекот КОТРИМОКСАЗОЛ:

- ако имате бубрежно оштетување, неопходно е прилагодување на дозата од страна на лекар,
- ако подолго време примате котримоксазол, неопходни се редовни контроли на крвната слика,
- ако земате некој други лекови погледнете во делот **Земање на други лекови.**

Ве молиме да се посоветувате со доктор и тогаш кога горенаведените укажувања се однесувале на Вас било кога во минатото.

Земање на лекот со храна или со пијалок

Советувајте се со вашиот доктор за начинот на земање на лекот. Котримоксазол може да се зема со или без храна.

Бременост и доење

Советувајте се со Вашиот доктор или фармацевт пред да земете било каков лек.



Влијание врз способноста за возење на автомобил или ракување со машини

Кај некои пациенти котримоксазол може да предизвика зашеметеност, доколку ова ви се случи Вам, бидете внимателни при возење на автомобил или ракување со машини.

Земање на други лекови (на што треба да се внимава ако употребувате други лекови)

Ве молиме да го информирате Вашиот доктор или фармацевт ако земате, или ако неодамна сте земале било кој друг лек, дури и оние кои не се на лекарски рецепт.

Ве молиме да имате во предвид дека овие укажувања можат да се однесуваат и на оние препарати кои што сте ги земале во минатото или ќе ги земате во иднина.

Особено е важно ако истовремено земате:

- фенитоин
- варфарин
- метотрексат
- диуретици (лекови за измокрување)

3. Како да се зема лекот

Строго придржувајте се кон упатствата на докторот. Дозите не смеете да ги менувате или лекувањето да го прекинувате без да се посоветувате со доктор.

Возрасни и деца постари од 12 години: 2 таблети од 480 mg секои 12 часа. При продолжено лечење (подолго од 14 дена) се дава 1 таблета од 480 mg два пати дневно.

Деца: Вообичаена дневна доза е 40 mg/kg сулфаметоксазол, а 8 mg/kg триметоприм, поделена во две дози.

Деца од 2 до 6 месеци: 1 / 2 лажичка суспензија два пати дневно.

Деца од 6 месеци до 2 години: 1 / 2 - 1 лажичка суспензија или 1 таблета од 120 mg два пати дневно.

Деца од 2 до 6 години: 1 лажичка суспензија или 2 таблети од 120 mg два пати дневно.

Деца од 6 до 12 години: 2 лажички суспензија или 4 таблети од 120 mg или 1 таблета од 480 mg два пати дневно.

Посебно дозирање:

Терапија на гонореа: 4 таблети од 480 mg на секои 12 часа во тек на два дена.



Следете ги инструкциите освен ако Вашиот доктор не ви препорачал поинаку.

Не заборавајте да го земете лекот.

Ако имате впечаток дека ефектот на лекот е премногу силен или премногу слаб, посоветувајте се со Вашиот доктор или фармацевт.

Ако сте земале поголема доза од лекот отколку што треба (предозирање):

Ако сте земале/употребиле поголема доза од лекот отколку што треба веднаш треба да се посоветувате со Вашиот доктор или фармацевт.

Ако сте заборавиле да го земете лекот КОТРИМОКСАЗОЛ:

Земете ја пропуштената доза колку што е можно побрзо.

Ако е речиси дојдено времето за земање на следната доза, почекајте додека да дојде времето за истата и земете ја, а прескокнете ја пропуштената доза.

Не земајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената доза

4. Мозни несакани дејства

Како и сите лекови, Котримоксазол може да има несакани дејства.

Ако се случи било што од долунаведеното, веднаш престанете со земањето на лекот и за истото веднаш известете го Вашиот доктор или одете во ургентното одделение во најблиската болница:

- Отекување на лице, усни или грло што може да предизвика тешкотии при голтањето или дишењето,
- Исип/ егзантема,

Сите овие се многу сериозни несакани дејства. Ако се појават кај Вас, тоа покажува многу сериозна алергиска реакција на лекот. Во таков случај Ви е потребна итна медицинска помош или хоспитализација.

Сите овие многу сериозни несакани дејства се многу ретки.

Ако забележите некои од следниве симптоми, веднаш известете го вашиот доктор или одете во ургентното одделение во најблиската болница:

- пожолтување на очите или кожата (жолтица),
- појава на невообичаен крварења или модрици,
- нагло покачување на температурата, треска.



Сите овие се сериозни несакани дејства, за кои е потребна итна медицинска помош.

Сериозните несакани дејства се ретки.

Известете го Вашиот доктор ако забележите:

- мачнина,
- повраќање,
- слабеење,
- главоболка,
- замор,
- дијареа,
- зашеметеност,
- вртоглавица.

Сите овие се слаби несакани дејства на КОТРИМОКСАЗОЛ.

Ако забележите било какви несакани дејства кои не се споменати во ова упатство, Ве молиме да го информирате Вашиот доктор или фармацевт.

5. Чување на лекот

Да се чува на температура до 25° C, заштитено од светлина.

ЛЕКОТ ЧУВАЈТЕ ГО НА МЕСТА НЕДОСТАПНИ ЗА ДЕЦА!

Перорална суспензија:

ПРОТРЕСЕТЕ ДОБРО ПРЕД УПОТРЕБА.

Рок на употреба

2 години

Лекот не смее да се употребува по датумот на истекот на рокот на употреба што е наведен на кутијата и на блистерот.

Начин на издавање на лекот

Лекот се издава само врз основа на рецепт.

Датум на последна ревизија на внатрешното упатство

Внатрешното упатство е одобрено на _____

Скопје, август, 2007 г.

