

АМИНОСТЕРИЛ Н – ХЕПА 8% / AMINOSTERIL N – HEPA 8%

Раствор за инфузија 500 ml

ПРЕД УПОТРЕБА НА ЛЕКОТ, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГО ЦЕЛОТО УПАТСТВО

- ▮ Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- ▮ Доколку имате дополнителни прашања обратете се кај Вашиот доктор или фармацевт.
- ▮ Овој лек Ви е препишан Вам лично и не треба да го давате на други лица, бидејќи може да им наштети дури ако нивните симптоми се исти како Вашите.
- ▮ Доколку било кое несакано дејство стане сериозно или ако забележите несакани дејства кои не се наведени во ова упатство, Ве молиме информирајте го Вашиот доктор или фармацевт.

Содржина:

- 1.Што претставува Aminosteril N – Hepa 8% и за што се употребува
- 2.Што треба да знаете пред да употребите Aminosteril N-Hepa 8%
- 3.Како да употребувате Aminosteril N-Hepa 8%
- 4.Можни несакани дејства
- 5.Чување на Aminosteril N-Hepa 8%
- 6.Други информации

КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН СОСТАВ

1000 ml раствор за инфузија содржи:

L-isoleucine 10.40 g
L-leucine 13.09 g
L-lysine monoacetate 9.71 g
што одговара на L-lysine 6.88 g
L-methionine 1.10 g
N-acetyl-L-cysteine 0.70 g
што одговара на L-Cysteine 0.52 g
L-phenylalanine 0.88 g
L-threonine 4.40 g
L-tryptophan 0.70 g
L-valine 10.08 g
L-arginine 10.72 g L-
histidine 2.80 g
glycine
5.82 g
L-alanine 4.64 g
L- proline 5.73 g L-
serine



2.24 g

Glacial acetic acid 4.42 g

Total Amino acids : 80 g/l

Total Nitrogen : 12.9 g/l

Total Energy : 1340 kJ/l = 320 kcal/l Theoretical

osmolarity : 770 mosm/l Titratable acidity : 12 -

25 mmol NaOH/l pH : 5.7 - 6.3

- Вода за инјекции

Производител

Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, AT-8055 Грац, Австрија

Носител на одобрението за промет

Рифам доо, Гостивар, Р. Македонија

1. Што претставува Aminosteril N-Нера 8% и за што се користи

Aminosteril N-Нера 8% е раствор за интравенска инфузија. Припаѓа на групата на лекови познати како раствор на аминокиселини за парентерална исхрана.

Aminosteril N-Нера 8% се користи за снабдување со аминокиселини, како дел од режим на парентерална исхрана во тешки форми на заболување на црниот дроб (хепатална инсуфициенција со и без хепатална енцефалопатија), кога оралната или ентерална исхрана е невозможна или недоволна или контраиндицирана.

2. Што треба да знаете пред да се даде Aminosteril N- Нера 8%

Не смеете да примате Aminosteril N-Нера 8% ако имате:

- | Пореметување во метаболизмот на аминокиселините
- | Метаболна ацидоза



- | Хиперхидратација
- | Хипонатриемија
- | Хипокалемија
- | Инсуфициенција на бубрезите
- | Декомпензирана срцева инсуфициенција
- | Шок
- | Хипооксија

Предупредувања и мерки на претпазливост

Вашиот лекар можеби ќе треба да преземе посебни мерки на претпазливост пред третманот со Aminosteril N-Нера 8% како што се:

- Да се обезбеди дека серумските електролити, балансот на течности и киселинско-базната рамнотежа треба да се следи и дека лабораториските тестови треба да се вклучуваат следење на крвта, серумските протеини, креатинин и функција на црниот дроб.
- Електролитите и јаглените хидрати треба да се администрираат во балансирани дози и да се инфундираат ако е потребно со користење на бајпас или мешани во вреќички во едно.
- Поради особините на препаратот, неговата примена во други случаи надвор од индикациите може да резултира со дисбаланс во аминокиселините или со тешки метаболни пореметувања.
- Изборот на периферна или централна вена зависи од финалната осмоларност на микстурата. Општо прифатен лимит на периферните инфузии изнесува околу 800 mosm/l, но истиот варира во зависност од возраста и општата состојба на пациентот и карактеристиките на периферните вени.
- За да се минимизира ризикот од тромбофлебитис при примена на периферна апликација, потребни се чести проверки на местот на инфузија.

Деца

Нема ускуство со деца

Земање на други лекови

Ве молиме да му кажете на Вашиот доктор или фармацевт ако земате или неодамна сте земале било какви други лекови, дури и оние кои сте ги земале без рецепт.

Употреба на Aminosteril N-Нера 8% раствор за инфузија со храна и пијалок

Не е познато дали Aminosteril N-Нера 8% има некаков негативен ефект кога се дава во исто време со храна и пијалок.

Бременост и доење



Не се изведени специфични студии за проценка на безбедноста на Aminosteril N- Нера 8% во тек на бременоста или доењето. Но, клиничкото искуство со компарабилни парентерални раствори на аминокиселини не покажале податок од ризик за бремените жени или доилки.

Ако сте бремени или доите, мислите дека сте бремени или планирате да забремените, прашајте го Вашиот лекар или фармацевт пред да земете било каков лек. Лекарот треба

да се разгледа односот корист / ризик пред давање Aminosteril N-Нера 8% на бремени жени и кај доилки.

Возење и ракување со машини

По добивањето Aminosteril N-Нера 8% на вашата способност за возење на автомобил или ракување со машини нема да бидат засегнати.

3. КАКО СЕ УПОТРЕБУВА AMINOSTERIL N – НЕРА 8 %

AMINOSTERIL N-НЕРА 8% се употребува во вид на континуирана интравенска инфузија. Дозирањето е индивидуално, према тежината на метаболичкото пореметување и према потребите на организмот за аминокиселини и течности.

Препорачана доза на **AMINOSTERIL N – НЕРА 8 %** изнесува $1.0-1.25 \text{ ml/kg t.t/h} = 0.08-0.1 \text{ g}$ аминокиселини на килограм телесна тежина / час, односно максимум 1.5 g аминокиселини / kg t.t на ден.

Максималната брзина на инфузија изнесува 1.25 ml / kg/h , што кореспондира со 0.1 g a.k./t.t/h .

Траењето на терапијата се одредува индивидуално според нормализирањето на симптомите.

Ако сте примиле повеќе Aminosteril N-Нера 8% отколку што треба

Вашиот лекар ќе се осигура дека ќе го добиете точното количество на Aminosteril N-Нера 8%. Меѓутоа, различни луѓе имаат потреба од различни дози, и ако дозата се докаже премногу за вас, вашиот лекар може да ја намали или веднаш да престане Aminosteril N-Нера 8%. Ако имате дополнителни прашања за употребата на овој лек, прашајте го Вашиот лекар или фармацевт.

4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА

Како и кај другите хипертонични инфузионни раствори при апликација во периферна вена можна е појава на тромбофлебит.

При коректно администрирање не се познати други несакани дејства од примената на препаратот.

Пријавување на несакани реакции

Несаканите реакции од лековите може да ги пријавите во Националниот центар за фармаковигиланца при Агенцијата за лекови и медицински средства (ул.Св.Кирил и Методиј бр.54 кат 1) или по електронски пат преку веб страната на Агенцијата <http://malmed.gov.mk/>.



5. КАКО ДА СЕ ЧУВА AMINOSTERIL N-HEPA 8%

Preparatот не треба да се чува на температура над 25°C. Да не се замрзнува. Да се чува заштитено од светлина

Лекот да се чува на места достапни за деца.

Рокот на траеше е означен на пакувањето. Да не се употребува после датумот кој е означен на пакувањето. Растворот веднаш треба да се користи по отворањето, и било кој дел од растворот кој останува по третманот треба да се фрли. Од микробиолошка гледна точка производот треба веднаш да се користи. Ако веднаш не се користи, времето на чување и условите пред употреба се одговорност на корисникот. Нормално, мешавината не треба да се чува подолго од 24 часа на температура од 2 до 8°C, освен ако мешањето не било изведено во контролирани и валидирани асептични услови.

За единечна употреба.

Се употребува само во стационарни здравствени установи.

6. ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ

Пакување

1 x 500 ml / стаклено шише

Производител

Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, AT-8055 Грац, Австрија

Носител на одобрението за промет во Р. Македонија

Рифам доо, Гостивар, Р. Македонија

Број и датум на одобрението за промет

Датум на прва и последна корекција на упатството
Јули, 2017

