

Упатство за пациент: Информации за корисникот

Humalog Mix25 100 единици/ml KwikPen суспензија за инјектирање во претходно наполнето пенкало

insulin lispro

Секој KwikPen испорачува 1 - 60 единици во чекори од 1 единица.

Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го упатството бидејќи содржи важни информации за Вас.

- Чувајте го ова упатство. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Ако имате дополнителни прашања, обратете се кај Вашиот лекар или фармацевт.
- Овој лек Ви е препишан само на Вас лично, и не треба да им го давате на други лица бидејќи може да им наштети дури и ако нивните знаци на болест се исти како Вашите.
- Ако добиете некое несакано дејство, разговарајте со Вашиот лекар или фармацевт. Ова вклучува секое можно несакано дејство кое не е наведено во ова упатство. Видете дел 4.

Што содржи ова упатство

1. Што претставува Humalog Mix25 KwikPen и за што се употребува
2. Што треба да знаете пред да употребите Humalog Mix25 KwikPen
3. Како да го употребувате Humalog Mix25 KwikPen
4. Можни несакани дејства
5. Како да го чувате Humalog Mix25 KwikPen
6. Содржина на пакување и други информации

1. Што претставува Humalog Mix25 KwikPen и за што се употребува

Humalog Mix25 KwikPen се користи за терапија на дијабетес. Тој претставува премикс суспензија. Активна супстанција е инсулин лиспро. 25% од инсулин лиспро во Humalog Mix25 KwikPen е растворен во вода и има побрзо дејство од хуманиот инсулин, поради малата промена во молекулата. 75% од инсулин лиспро во Humalog Mix25 KwikPen е во вид на суспензија со протамин сулфат, и на тој начин неговото дејство се продолжува.

Дијабетот е болест кога панкреасот не создава доволно инсулин, и не може да се регулира нивото на глукоза во организмот. Humalog Mix25 е замена за Вашиот сопствен инсулин, и се користи за доготрајна контрола на гликозата во крвта. Активноста му започнува многу брзо, и трае подолго отколку на растворливиот инсулин. Humalog Mix25 треба да го земете во 15-тата минута од оброкот.

Вашиот лекар може да Ви препорача користење на Humalog Mix25 KwikPen, и како инсулин со подолго дејство. Секој тип на инсулин има упатство за пациентот, во кое има информации за препаратот. Не го менувајте инсулинот, додека Вашиот лекар не Ви го препорача тоа. Бидете внимателни ако го промените инсулинот.



KwikPen е наполнето пенкало за еднократна употреба кое содржи 3 ml (300 единици, 100 единици/ml) на инсулин лиспро. Еден KwikPen содржи повеќе дози на инсулин. KwikPen избира 1 единица. **Бројот на единици е прикажан на прозорецот за доза, секогаш проверувајте го пред инјектирање.** Може да земете 1 до 60 единици при единечно инјектирање. **Ако Вашата доза е повеќе од 60 единици, може ќе треба да примите повеќе од една инјекција.**


2. Што треба да знаете пред да употребите Humalog Mix25 KwikPen

НЕ употребувајте Humalog Mix25 KwikPen

- ако мислите дека започнува состојба на **хипогликемија** (намален шеќер во крвта). Понатаму во текстот следи упатство за справување со блага хипогликемија (видете дел 3: Ако земете повеќе Humalog Mix25 отколку што е потребно).
- ако сте **алергични** на инсулин лиспро или на некоја од состојките присутни во овој лек (дадени во дел 6).

Предупредувања и мерки на претпазливост

- Секогаш проверувајте го пакувањето и налепницата на претходно наполнетото пенкало за името и типот на инсулин кога го подигнувате од Вашата аптека. Осигурајте се дека го добивате Humalog Mix25 KwikPen што вашиот лекар Ви кажал да го користите.
- Ако нивото на глукозата во крвта е добро контролирано со досегашната инсулинска терапија, може да не ги почувствувате предупредувачките симптоми кога нивото на гликозата паѓа многу ниско. Предупредувачките знаци се наброени понатаму во ова упатство. Мора внимателно да размислите кога да ги земате Вашите оброци, колку често да вежбате и колку многу да работите. Исто така, треба често да го контролирате нивото на глукозата во крвта.
- Неколку пациенти кои имале хипогликемија после преминување од животински на хуман инсулин, пријавиле дека раните предупредувачки симптоми биле помалку очигледни или различни. Ако често имате хипогликемија или ако имате потешкотии да ја препознаете, разговарајте со Вашиот лекар.
- Ако одговорите со ДА на некое од следниве прашања, известете го лекарот, фармацевтот или медицинската сестра од одделот за дијабетес
 - Дали во скоро време сте биле болни?
 - Дали имате проблеми со Вашите бубрези или со црниот дроб?
 - Дали вежбате повеќе од вообичаено?
- Количината на инсулин која Ви е потребна може исто така да се промени ако пиете алкохол.
- Потребно е да го известите Вашиот лекар, фармацевт или медицинската сестра од одделот за дијабетес ако планирате да одите во странство. Временската разлика помеѓу земјите може да значи дека ќе ги примате оброците и инјекциите во различно време, отколку кога сте дома.
- Некои пациенти кои подолго време имаат дијабетес мелитус тип 2 и срцево заболување или претходен инфаркт, и кои биле третирани со глиоглитазон и инсулин, добиле срцева инсуфициенција. Информирајте го Вашиот лекар што побрзо, ако доживеете знаци на срцева инсуфициенција како невообичаено губење на здивот (краток здив) или брзо зголемување на телесната тежина или локализирана отоци (едем).



- Ова пенкало не е наменето за употреба од страна на слепи лица или лица со нарушен вид без помош од друго лице обучено за употреба на пенкалото.

Промени на кожата на местото на инјектирање.

Местото на инјектирање треба да се менува за да се спречат промени на кожата, како што се згрутчувања под кожата. Инсулинот може да не делува соодветно ако инјектирате во дел каде што има згрутчувања (Погледнете како да го користите Humalog Mix25 KwikPen).

Контактирајте го вашиот лекар ако моментално инјектирате во задебелениот дел пред да започнете да инјектирате во друга област. Вашиот лекар може да ви каже повнимателно да го следите шеќерот во крвта и да ја прилагодите дозата на инсулин или други антидијабетични лекови.

Други лекови и Humalog Mix25 KwikPen

Вашиите потреби за инсулин може да се променат ако земате

- контрацептивни таблети,
- стероиди,
- супституциона терапија на тироиден хормон,
- орални хипогликемици,
- ацетил салицилна киселина,
- сулфа антибиотици,
- октреотид,
- "бета₂ стимуланси" (пр. ритодрин, салбутамол или тербуталин),
- бета-блокатори, или
- некои антидепресанти (моноамино оксидаза инхибитори или селективни инхибитори на превземањето на серотонин),
- даназол,
- некои АЦЕ инхибитори (пр. каптоприл, еналаприл), и
- ангиотензин II рецептор блокатори.

Ве молиме известете го Вашиот лекар ако земате, во скоро време сте земале или можеби ќе земате други лекови вклучително и лекови кои се издаваат и без лекарски рецепт (видете дел "Предупредувања и мерки на претпазливост").

Бременост и доене

Дали сте бремена, или мислите да останете бремена, и дали доите? Количината на инсулин која Ви е потребна, вообичаено опаѓа во првите три месеци од бременоста, а се зголемува во следните шест месеци. Ако доите, можеби ќе треба да ја промените дозата на инсулин, и начинот на исхрана. Прашајте го лекарот за совет.

Употреба на моторни возила и машини

Вашата способност да се концентрирате и да реагирате може да биде намалена, ако имате хипогликемија. Ве молиме имајте го овој можен проблем на ум во сите ситуации кога може да се ставите себеси и другите во ризик (управување со возило или машини). Треба да го контактирате Вашиот доктор за способноста за управување со возило ако имате:



- чести епизоди на хипогликемија
- намалени или отсутни предупредувачки знаци за хипогликемија

Humalog Mix25 KwikPen содржи натриум

Производот содржи помалку од 1 mmol натриум (23 mg) на доза, односно може да се каже дека е “без натриум”.

3. Како да го употребувате Humalog Mix25 KwikPen

Секогаш употребувајте го Humalog Mix25 KwikPen како што Ви препорачал лекарот. Прашајте го лекарот, ако нешто не Ви е јасно. За да се спречи можна трансмисија на болести, секое пенкало мора да се користи само од страна на еден пациент, дури и доколку иглата е променета.

Доза

- Humalog Mix25 треба да го инјектирате во 15-тата минута од оброкот. Ако е потребно, може да го инјектирате брзо после оброкот. Но Вашиот лекар ќе ви каже колку инсулин да инјектирате, кога да го инјектирате, и колку често. Овие инструкции се само за Вас. Следете ги инструкциите, и редовно посетувајте ја клиниката за дијабет.
- Ако го смените типот на инсулин кој го употребувате (пр. од хуман или животински инсулин на Humalog) ќе се промени дозата што ќе ја примате. Оваа промена може да се изврши при првото наредно инјектирање, или да биде постепена, и да трае неколку недели или месеци.
- Humalog Mix25 KwikPen е погоден само за инјектирање под кожата. . Разговарајте со Вашиот лекар ако треба да инјектирате инсулин преку друг метод.

Припремање на Humalog Mix25 KwikPen

- Пенкалото треба да се ротира во дланките 10 пати и да се превртува за 180° десет пати веднаш пред употреба за да се ресуспендира инсулинот, и суспензијата да биде униформно заматена или млечна. Ако не се добие бараниот изглед, повторете ја постапката. Патроните содржат мало стаклено топче кое го потпомага мешањето. Не го тресете силно пенкалото, за да не се создаде пена која може да го наруши дозирањето. Патроните треба често да се прегледуваат и не треба да се употребуваат ако има појава на грутки или цврсти бели частици кои се лепат за дното или по сидот на патронот, и му даваат замрзнат изглед. Пред инјектирање, секогаш проверувајте го изгледот на суспензијата.

Припремање на Humalog Mix25 KwikPen за употреба (Видете го упатството за употреба)

- Измијте ги рацете.
- Прочитајте ги инструкциите за тоа како се употребува наполнето инсулинско пенкало. Следете ги инструкциите внимателно. Во продолжение се дадени одредени потсетувања.
- Користете чиста игла. (Игли не се вклучени).
- Пробајте го Вашиот KwikPen пред секоја употреба. На тој начин ќе проверите дали инсулинот излегува надвор и дали ќе ги сними воздушните меури од Вашето пенкало.



Можно е сеуште да има мали воздушни меурчиња во пенкалото - но тие се безопасни. Но ако воздушните меури се премногу големи, може да влијаат врз дозата на инсулин.

Инјектирање на Humalog Mix25

- Пред да го инјектирате Humalog, исчистете ја Вашата кожа, како што Ви било кажано. Инјектирајте под кожата како што Ви е објаснето. Не инјектирајте директно во вена. После инјектирањето, оставете ја иглата во Вашата кожа 5 секунди, за да се осигурате дека сте ја примиле целата доза. Немојте да го триете регионот каде сте извршиле инјектирање. Осигурајте се дека сте инјектирале на најмалку 1 cm растојание од минатото инјектирање, и дека ги ротирате местата на инјектирање, како што Ви е кажано.

После инјектирање

- Откако сте го завршиле инјектирањето, извадете ја иглата од пенкалото со користење на капачето од иглата. На тој начин, инсулинот ќе се одржува стерилен, и ќе се прекине истекувањето. Исто така, се спречува навлегувањето на воздух во пенкалото и затнување на иглата. **Не ги делете иглите, ниту пенкалото** со други лица. Заменете го капачето на Вашето пенкало.

Понатамошно инјектирање

- За секоја употреба на KwikPen користете нова игла. Пред секое инјектирање отстранете ги воздушните меурчиња. За да видите колку инсулин останал држете го пенкалото со иглата нагоре. Скалата на патронот покажува уште колку единици останале.
- Не мешајте друг инсулин во Вашето пенкало. Кога пенкалото KwikPen е празно, не го користете повторно. Исфрлете го внимателно - Вашиот фармацевт или медицинската сестра од одделот за дијабетес ќе Ве информираат како да го отстраните најсоодветно.

Ако употребите повеќе Humalog Mix25 отколку што треба

Ако употребите повеќе Humalog Mix25 од потребното или доколку не сте сигурни колку сте инјектирале, може да дојде до намалување на гликозата во крвта. Проверете го шеќерот во крвта.

Ако таа има ниска вредност (**блага хипогликемија**), јадете глукозни таблети, шеќер или пијте слатки напитки. Потоа јадете овошје, бисквити или сендвич, како што Ви препорачал лекарот, и одморете се. На ваков начин ќе ја надминете благата хипогликемична криза, или малото предозирање со инсулин. Ако состојбата се влоши, дишењето Ви стане отежнато, а кожата бледа, веднаш известете го лекарот. Кај тешка хипогликемија, се дава инјекција со глукагон. Јадете гликоза или шеќер после глукагонската инјекција. Ако немате подобрување од глукагонот, ќе мора да одите во болница. Побарајте лекарот да Ви објасни за глукагон.

Ако сте заборавиле да употребите Humalog Mix25

Ако земате помалку Humalog Mix25 отколку што е потребно или доколку не сте сигурни колку сте инјектирале, ќе дојде до зголемено ниво на гликоза во крвта. Проверете го шеќерот во крвта.

Ако дојде до состојба на хипогликемија (**ниско ниво на шеќер во крвта**) или хипергликемија (**високо ниво на шеќер во крвта**), и ако истите не се лекуваат може да дојде до појава на сериозни



симптоми како главоболка, гадење, повраќање, дехидратација, губење на свест, кома или смрт (видете А и Б во дел 4 "Можни несакани дејства").

Три едноставни чекори за да спречите хипогликемија или хипергликемија се:

- Секогаш имајте резервен шприц и вијала од Humalog Mix25, или резервно пенкало и патрони, поради постоење на можност да го изгубите Вашиот KwikPen или да се оштети.
- Секогаш носете некој документ кој укажува дека сте дијабетичар.
- Секогаш носете шеќер со Вас.

Ако престанете да употребувате Humalog Mix25

Ако земате помалку Humalog Mix25 ќе дојде до зголемување на шеќерот во крвта. Не го менувајте инсулинот, освен ако не Ви препорача лекарот.

Ако имате дополнителни прашања за овој производ, прашајте го лекарот или фармацевтот.

4. Можни несакани дејства

Како и сите лекови, овој лек може да предизвика несакани дејства, иако секој не ги добива.

Системската алергија е ретка ($\geq 1/10,000$ до $< 1/1,000$). Присутни се следниве симптоми:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| • исип по целото тело | • опаѓање на крвниот притисок |
| • потешкотии со дишењето | • брзо срцебиене |
| • свирење во градите | • потење |

Ако мислите дека имате ваква алергија на Humalog Mix25 инсулин, известете го лекарот.

Честа е локална алергија ($\geq 1/100$ до $< 1/10$). Некои пациенти добиваат црвенило, оток и сврабеж околу местото на администрација. Оваа промена трае од неколку денови, до неколку недели. Известете го лекарот ако Ви се случи ваква појава.

Липодистрофија е помалку честа ($\geq 1/1,000$ до $< 1/100$). Доколку инјектирате инсулин премногу често на исто место, масното ткиво може да се намали (липоатрофија) или да се згусне (липохипертрофија). Згрутчувањата под кожата исто така може да бидат предизвикани од насобирање на протеин наречен амилоид (кожна амилоидоза). Инсулинот може да не делува соодветно ако инјектирате во дел каде што има вакви згрутчувања. Променете го местото на инјектирање со секоја инјекција за да помогнете во спречување на овие промени на кожата.

Пријавени се случаи на едем при инсулинска терапија (отекување на рацете, глуждовите; задржување на течности), особено на почеток на инсулинска терапија или за време на промена на терапијата со цел да се овозможи контрола на нивото на глюкоза во крвта.

Пријавување на несакани дејства

Ако добиете некое несакано дејство, разговарајте со Вашиот лекар или фармацевт. Ова вклучува можни несакани дејства кои не се наорени во ова упатство. Може исто така да ги пријавите несаканите дејства директно во Агенцијата за лекови и медицински средства на Република



Северна Македонија (ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 кат 1) или по електронски пат преку веб страната на Агенцијата <http://malmed.gov.mk/>.. Со пријавување на несаканите дејства може да помогнете да се обезбедат повеќе информации за безбедноста на овој лек.

Чести проблеми со дијабетесот

А. Хипогликемија

Хипогликемија (ниско ниво на шеќер во крв) значи дека нема доволно гликоза во крвта. Тоа може да биде предизвикано ако:

- земете поголема количина на Humalog Mix25 или друг инсулин;
- пропуштите или одложите оброк или го промените режимот на исхрана;
- вежбате или интензивно работите пред или после оброк;
- имате некаква инфекција или болест (особено пролив или повраќање);
- има промена во Вашите потреби за инсулин; или
- имате проблеми со бубрезите или со црниот дроб, и истите се влошуваат.

Алкохолот и некои лекови може да влијаат врз нивото на глукоза во крвта.

Првите симптоми на низок шеќер во крвта вообичаено брзо се јавуваат и вклучуваат:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • замор | • срцебиене |
| • нервоза и треперење | • се чувствувате лошо |
| • главоболка | • ладна пот |

Доколку не можете да ги препознаете предупредувачките симптоми, избегнувајте ситуации, како на пр. управување со моторно возило, во кои Вие или останатите ќе бидете ставени на ризик поради хипогликемијата.

Б. Хипергликемија и дијабетична кетоацидоза

Хипергликемија (покачено ниво на гликоза во крвта) значи дека Вашето тело нема доволно инсулин. Хипергликемија може да настане ако:

- не го земате Вашиот Humalog или друг инсулин;
- земате помалку инсулин отколку што Ви кажал Вашиот доктор;
- јадете премногу; или при
- треска, инфекција или емоционален стрес.

Хипергликемијата може да води до дијабетична кетоацидоза. Првите симптоми се јавуваат споро после неколку часови или денови. Симптомите се следниве:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| • поспаност | • недостаток на апетит |
| • црвенило на лицето | • овошен мирис на здивот |
| • жед | • се чувствувате лошо |

Тешки симптоми се тешко дишење и забрзан пулс. Веднаш побарајте медицинска помош.



В. Болест

Ако сте болни, или не се чувствувате добро, можеби ќе биде потребна промена на количината на инсулин. **И кога не јадете нормално, сепак Ви е потребен инсулин.** Тестирајте ја крвта и урината, и известете го Вашиот лекар.

5. Како да го чувате Humalog Mix25 KwikPen

Пред првата употреба чувајте го Humalog Mix25 KwikPen во фрижидер (2°C - 8°C). Да не се замрзнува.

Humalog Mix25 KwikPen кој сте почнале да го употребувате, чувајте го на собна температура (под 30°C) и отстранете го после 28 дена. Не го чувајте во близина на извор на топлина, или изложен на сонце. Humalog Mix25 KwikPen кој го употребувате не го чувајте во фрижидер. KwikPen да не се чува со прицврстена игла.

Да се чува подалеку од вид и дофат на деца.

Не го употребувајте овој лек после истекот на датумот на рокот на траење кој е означен на картонската кутија и на налепницата. Датумот на рокот на употреба се однесува на последниот ден од наведениот месец.

Овој лек не треба да се употребува ако забележите дека има појава на грутки или цврсти бели партикули кои се лепат за дното или по сидот на патронот, и му даваат замрзнат изглед. Пред инјектирање, секогаш проверувајте го изгледот на суспензијата.

Лековите не треба да се отстрануваат преку отпадните води и водите од домаќинствата. Прашајте го Вашиот фармацевт како да ги остраниле лековите кои повеќе не Ви се потребни. Овие мерки ќе помогнат да се заштити околината.

6. Содржина на пакување и други информации

Што содржи Humalog Mix25 100 единици/ml KwikPen суспензија за инјектирање

- Активната супстанција е инсулин лиспро. Таа се произведува лабораториски преку технологија со рекомбинантна ДНК. Инсулин лиспро се разликува од хуманиот инсулин, и од другите хумани и животински инсулини. Но сепак, тој е сличен со хуманиот инсулин, кој е природен хормон произведен од панкреасот.
- Останати состојки се протамин сулфат, м-крезол, глицерол, дибазичен натриум фосфат $7H_2O$, цинк оксид и вода за инјекции. Натриум хидроксидот или хлороводородната киселина се употребуваат за регулирање на киселоста.



Како изгледа Humalog Mix25 100 единици/ml KwikPen суспензија за инјектирање и содржина на пакувањето

Humalog Mix25 100 единици/ml KwikPen суспензија за инјектирање е бела, стерилна суспензија и содржи 100 единици на инсулин лиспро во секој милилитар (100 единици/ml) суспензија за инјектирање. 25% од инсулин лиспро во Humalog Mix25 KwikPen е растворен во вода. 75% од инсулин лиспро во Humalog Mix25 KwikPen е во вид на суспензија со протамин сулфат. Секое пенкало содржи 300 единици (3 милилитри). Humalog Mix25 KwikPen пакувањето содржи 5 наполнети инјекциски пенкала, или мултипакување од 2 x 5 наполнети инјекциски пенкала. Humalog во наполнетото инјекциско пенкало е истиот како Humalog кој е произведен во Humalog патроните. Во пенкалото е вграден патрон. Кога KwikPen ќе се испразни, не може повторно да се употребува.

Носител на одобрение за ставање на лекот во промет и Производител:

Humalog Mix25 100 единици/ml KwikPen суспензија за инјектирање е произведен од:

- Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Франција,
- Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Италија.

Носител на одобрение за ставање во промет е: Фарма Трејд дооел, ул. Антон Попов бр. 1/1-3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Ова упатство е последен пат ревидирано во 03/2021.

ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА

Ве молиме видете го текстот во прирачникот во продолжение.



