

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
ELOCOM[®] lotion / ЕЛОКОМ[®] лосион
mometasone furoate

Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го упатството.

- Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Ако имате дополнителни прашања, обратете се кај Вашиот лекар или фармацевт.
- Овој лек Ви е препишан Вам лично и не треба да го давате на други лица, бидејќи може да им наштети дури ако нивните симптоми се исти како Вашите.
- Ако некои од несаканите ефекти се влошат до сериозни, или доколку забележите несакан ефект кој не е наведен во ова упатство, информирајте го Вашиот лекар или фармацевт.

Содржина:

1. Што претставува Елосом и за што се употребува
2. Што треба да знаете пред да употребувате Елосом
3. Како да употребувате Елосом
4. Можни несакани дејства
5. Чување на Елосом

ELOCOM[®] лосион

мометазон фууроат

За надворешна употреба

Состав

Еден грам Елосом[®] лосион 0,1% содржи 1mg мометазон фууроат.

Помошни супстанции: изопропанол, хидроксипропил целулоза, натриум дихидроген фосфат дихидрат, пропиленгликол, прочистена вода и фосфорна киселина.

Фармацевтска форма / пакување

Елосом[®] лосион 0,1% - шише со 20ml лосион.

Елосом[®] лосион 0,1% - шише со 30ml лосион.

Производител

Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Белгија и/или
Schering-Plough S.p.A Via F. Kennedy 5, I-26833 Comazzo, Италија.

Број и датум на одобрението за промет

20ml: 15-5568/12 од 01.08.2012,

30ml: 15-5569/12 од 01.08.2012.

Носител на одобрението за ставање во промет

Претставништво ШЕРИНГ-ПЛАУ ЦЕНТРАЛ ИСТ АГ- Скопје,
Ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје, Македонија
Тел. 3230 728

Начин на издавање на лекот

Лекот се издава на лекарски рецепт (P).

1. Што е Елосом[®] и за што се употребува?

Дејство

Elocom[®] лосион спаѓа во групата на кортикостероиди кои се употребуваат за ублажување на воспалителни и пруритички симптоми на дерматози кои реагираат на кортикостероиди, како што се псоријаза и атопичен дерматит.

2. Што треба да знаете пред да употребите Elocom[®]?

Да не се употребува Elocom[®]:

- доколку Вие или Вашето дете сте преосетливи на мометазон фуроат, на било која помошна супстанција на лекот или на други кортикостероиди;
- доколку имате мали сипаници, херпес или други инфекции на скалпот. Советувајте се со својот лекар или фармацевт доколку не сте сигурни;
- пред употреба на лекот, информирајте го Вашиот лекар или фармацевт доколку сте бремени или доите;
- доколку Вашиот скалп е осетлив или се иритира при употребата на Elocom лосион, престанете со терапијата.

3. Како се употребува Elocom[®] лосион?

Неколку капки Elocom[®] лосион се нанесуваат на заболеното место на кожата, вклучувајќи и влакнести делови, еднаш дневно. Лосионот треба нежно да се втрие на заболеното место додека потполно не се апсорбира.

Следете ги инструкциите за употреба на Elocom[®] лосион:

- лосионот се нанесува само на скалпот. Не го нанесувајте на други места на телото;
- не го нанесувајте лосионот кај деца подолго од 5 дена;
- не нанесувајте голема количина од лосионот подолго време (пр. секој ден, неколку недели или месеци);
- одбегнувајте контакт на лосионот со Вашите очи;
- доколку Ви се јави инфекција на скалпот за време на употребата на Elocom[®] лосион, информирајте го Вашиот лекар или фармацевт, затоа што може да ви даде друг вид на терапија.

Доколку сте заборавиле да аплицирате Elocom[®] лосион

Аплицирајте го лосионот веднаш штом се сетите, а потоа продолжете со вообичаената терапија.

Што треба да направите во случај на предозирање со Elocom[®] лосион

Во случај на ненамерно проголтавање на Elocom[®] лосион, може да не се појават несакани ефекти. Доколку сте загрижени, информирајте го својот лекар.

Доколку го употребувате Elocom[®] лосион подолго од препорачаното или го нанесувате на голема површина, може да влијае на некои од Вашите хормони. Кај деца може да влијае врз растот и развојот.

Доколку не сте ги следеле инструкциите од Вашиот лекар во однос на начинот на употреба или доколку го нанесувате лосионот многу често и/или подолго време, информирајте го својот лекар.

4. Можни несакани ефекти.

Локални несакани реакции кои ретко се јавуваат при употреба на Elocom[®] лосион, вклучуваат: жарење, чешање, печење, воспаление на фоликулите, алергиски кожни реакции, обезбојување на кожата, зголемен раст на влакна, истенчување и црвенило на кожата, акни.

За секое несакано дејство информирајте го Вашиот лекар или фармацевт.

5. Чување на Elocom[®] лосион.

Да се чува на температура 2⁰С до 25⁰С.
Лекот да се чува на места достапни за деца!

Рок на траење

Рокот на траење е обележан на пакувањето. По отворање, лекот може да се користи еден месец ако се чува на температура до 25⁰С. Немојте да го употребувате лекот по истекот на рокот на употреба.

Датум на последна ревизија на текстот

Јули 2012.