

УПАТСТВО ЗА ПАЦИЕНТОТ

Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го упатството.

- Чувајте го унајснвојно. Можеби ќе треба да го прочишате повторно.
- Ако имате дојолнишелни прашања, обрашете се кај Вашиот лекар или фармацевт.
- Овој лек Ви е прешан Вам лично и не треба да им го давате на други лица, бидејќи може да им нашетни дури и ако нивните симптоми се исти како Вашите.

Упатството содржи:

1. Што прешставува лекој Erynorn и за што се уошребува
2. Што мора да знаете, пред да го уошребите лекој Erynorn
3. Како да го уошребувате лекој Erynorn
4. Можни несакани дејства на лекој Erynorn
5. Чување и рок на уошреба на лекој Erynorn
6. Дојолнишелни информации

ERYNORM / ЕРИНОРМ

losartan

филм-обложени таблети

Активна сушшаницја: лосартан калиум.

Помошни сушшаници:

Јадро на шаблеша: микрокристална целулоза, лактоза монохидрат, прешелатинизиран скроб, кроскармелоза натриум, магнезиум стеарат, безводен колоиден силициум диоксид.

Обвивка на шаблеша: Opadry OY-S-7331 white.

Производител

HEMOFARM A.D., ул. Београдски пут б.б., Вршац, Р. Србија.

Носител на одобрението за ставање во промет:

ХЕМОФАРМ А.Д. ФАРМАЦЕВТСКО-ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА
ПРЕТСТАВНИШТВО СКОПЈЕ

ул. Иво Лола Рибар 39/1-1, Скопје, Р.Македонија.

1. ШТО ПРЕТСТАВУВА ERYNORM И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА

Состав

Една филм-обложена таблета Erynorn содржи 50 mg или 100 mg лосартан во форма на калиумова сол.

Пакување

Erynorn филм-обложени таблети од 50 mg: 14 филм-обложени таблети во блистер (PVC/PVdC-Al). Пакување од 28 филм-обложени таблети од 50 mg.

Erynorn филм-обложени таблети од 100 mg: 14 филм-обложени таблети во блистер (PVC/PVdC-Al). Пакување од 28 филм-обложени таблети од 100 mg.



Како делува ERYNORM ?

Егупорт содржи активна состојка лосартан, која припаѓа на групата лекови познати како ангиотензин II антагонисти. Ангиотензин II е хемиска супстанција која се јавува во организмот и ги стеснува крвните садови причинувајќи зголемување на крвниот притисок (хипертензија). Егупорт ги блокира овие ефекти на ангиотензинот и доведува до релаксација на крвните садови и намалување на крвниот притисок.

Егупорт може да го намали ризикот од цереброваскуларни инциденти (овој ефект на Егупорт не може да се докаже кај припадниците на црната раса) кај пациенти кои имаат хипертрофија на левата комора и зголемен крвен притисок.

Егупорт го спречува влошувањето на оштетувањето на бубрезите кај пациенти со дијабетес мелитус тип II кои веќе имаат оштетување на бубрезите (преку следење на протеините во урина).

Кога се употребува ERYNORM ?

Егупорт се користи за лекување на зголемен крвен притисок, спречување на цереброваскуларни инциденти, кај пациенти кои имаат зголемен крвен притисок придружен со хипертрофија на левата комора и спречување на прогресијата на оштетување на бубрезите кај пациенти со дијабетес мелитус тип II.

2. ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА ГО УПОТРЕБИТЕ ЛЕКОТ ERYNORM

Информирајте го Вашиот доктор ако имате некоја хронична болест, метаболично заболување, ако сите алергични на овој лек или на други лекови или ако користите други лекови.

Немојте да употребувате ERYNORM ако:

- сте имале или имате алергија на лосартан или на помошните состојки од лекот;
- сте или мислите дека сте или планирате да бидете бремена;
- доите.

Безбедноста и ефикасноста кај деца, посебно кај новородени или деца кои имаат тешко бубрежно или заболување на црниот дроб не е доволно утврдена.

При употреба на Егупорт посебно треба да го предупредите Вашиот доктор во следните случаи :

- Доколку сте имале алергиска реакција во форма на диспнеа, едем на лице, јазик, уста, хранопровод или грло при претходна употреба на лосартан или лек од групата на инхибитори на АКЕ (еналаприл, лизиноприл и т.н.);
- Имате заболување на црниот дроб или бубрезите или имате извршена трансплантација на бубрег;
- Земате големи дози на диуретици;
- Неодамна сте имале проблем со интензивно повраќање и/или пролив (хиповолемија);
- Имате срцево заболување или состојба наречена “аортална стеноза” при која има опструкција на течењето на крвта од левата комора;
- Имате стеснување или блокада на крвните садови кои водат во бубрезите (стеноза на бубрежните артерии-единечен бубрег или билатерално);
- Имате високи вредности на калиум во крвта (хиперкалиемија);
- Спроведувате специјална диета, со малку сол.

Употреба на Егупорт со храна или со пијалок

Лекот може да се зема независно од употребата на храна и пијалок.

Бременост и доене



Совешувајте се со Вашиот доктор или фармацевт пред да земете било каков лек. Егунорм филм-обложените таблети не смее да се земаат за време на бременост и доене.

Влијание врз способноста за возење на автомобил или ракување со машини

Бидете внимателни додека возите или управувате со машини. Егунорм може да предизвика вртоглавица или сонливост, избегнувајте да возите или управувате со машини.

Што треба да знаете во однос на помошните состојки кои ги содржи Егунорм

Во случај на неподнесување на некои шеќери кои ги содржат Егунорм филм-обложените таблети (види помошни супстанции) кажете му на Вашиот доктор пред да започнете да го примате овој лек.

Употреба на други лекови

Ве молиме да го информирајте Вашиот доктор или фармацевт ако земате или ако до неодамна сите земале било кој друг лек, дури и оние кои не се на лекарски рецепти.

Информирајте го Вашиот доктор ако земате некој од следниве лекови:

- лекови кои може да го зголемат нивото на калиум во крвта (диуретици кои штетат калиум, лекови со кои се надоместува калиум или додатоци на храна кои содржат калиум);
- рифампицин (за терапија на туберкулоза);
- флуконазол (за терапија на габични инфекции);
- индометацин или други нестероидни антиинфламаторни лекови (лекови кои се користат за лекување на мускулоскелетни заболувања како што е артритис);
- големи дози на диуретици (лекови кои ја зголемуваат количината на урина).

3. КАКО ДА СЕ УПОТРЕБУВА ЛЕКОТ ERYNORM

Строго придржувајте се кон укажувањата на докторот. Дозите не смее да ги менувате или лекувањето да го прекинувате без да се консултирате со доктор. Ако сметате дека ефектот на лекот е премногу слаб или премногу силен, консултирајте се со Вашиот доктор.

Егунорм треба да се дава еднаш на ден за време на јадење или независно од него, по можност во ист период на денот.

Препорачано дозирање кај возрасни

Зголемен крвен притисок

Вообичаена доза на Егунорм филм-обложени таблети кај најголем број возрасни пациенти е 50 mg, еднаш на ден. Докторот може да препише помала доза, пример 25 mg еднаш на ден кај некои групи пациенти како што се лица постари од 75 години, пациенти со бубрежни заболувања или со заболувања на црниот дроб. Докторот може да ја зголеми дозата на 100 mg еднаш на ден кај некои пациенти, ако е тоа потребно.

Зголемен крвен притисок со хипертрофија на лева комора

Вообичаена доза на Егунорм кај овие пациенти е 50 mg еднаш на ден. Вашиот доктор може да препише помала доза на диуретик истовремено со Егунорм и/или да ја зголеми дозата на Егунорм на 100 mg еднаш на ден.

Дијабетес мелитус тип II со оштетенa функција на бубрежите (појава на протеини во урина)

Вообичаена доза на Егунорм е 50 mg, еднаш на ден. Дозата може да се зголеми на 100 mg еднаш на ден во зависност од нивото на крвниот притисок.



Препорачано дозирање кај деца

Зголемен крвен притисок кај деца на возраст помеѓу 6 и 16 години

Се препорачува доза од 25 mg еднаш на ден кај деца кои може да голтаат таблети и кои имаат телесна тежина помеѓу 20 и 50 kg. Дозата може да се зголеми до максимум 50 mg еднаш на ден.

Почетна доза од 50 mg еднаш на ден се препорачува кај деца кои имаат телесна тежина поголема од 50 kg и дозата може да се зголеми до максимум 100 mg еднаш на ден.

Вашиот доктор ќе ја одреди адекватната доза во зависност од нивото на крвниот притисок и телесната тежина на вашето дете.

Ако сте земале поголема доза од лекот отколку што е потребно:

Ако сѐ земале поголема доза од лекот отколку што треба, веднаш треба да се посоветувате со Вашиот доктор или фармацевт.

Најочекуваното дејство од предозирање е хипотензија и тахикардија. Брадикардија може да се јави исто така.

Ако сте заборавиле да земете Erynorm:

Ако сѐ заборавиле да го земат лекот на време не се вознемирувајте.

Земете го лекот веднаш штом ќе се сетите. Ако се приближува времето за земање на следната доза, изоставете ја пропушената доза. Не земајте двојна доза за да ја надоместите пропушената доза.

4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА НА ЛЕКОТ ERYNORM

Како и сите лекови, Erynorm може да предизвика несакани дејства кај некои пациенти.

Несаканите дејства обично се благи или умерено тешки и минливи така што не бараат прекин на терапијата. Оштетена функција на црниот дроб може да се јави кај некои пациенти (жолта обоеност на кожата и белката на окото и симптоми слични на грип), пролив, болка во мускулите и зглобовите, анемија (може да се манифестира со замор и задув кои се јавуваат поради малиот број на еритроцити и хемоглобин во крвта), мигрена, кашлица, раш, уртикарија, јадеж и ненадејно намалување на крвниот притисок (замаглен вид, вртоглавица посебно во стоечка положба). Поретко може да се јави тромбозитопенија (намалување на бројот на тромбоцити) и се манифестира со спонтано појавување на модрици и крварење.

Најчести несакани дејства на лосартан кај пациентите со висок крвен притисок и хипертрофија на левата комора се слабост, замор и вртоглавица.

Најчесто несакано дејство кај пациентите со дијабетес мелитус тип II и оштетена функција на бубрезите (кога има протеини во урината) се слабост, замор, вртоглавица, намалување на крвниот притисок и зголемени вредности на калиум во крвта. Вашиот доктор може повремено да побара од Вас да направите анализи на крвта за следење и контрола на нивото на калиум.

Ретко се јавуваат алергиски реакции кај пациентите кои примаат Erynorm. Алергиската реакција може да се манифестира со оток на лицето, устата, хранопроводот и/или јазикот, што може да предизвика тешкотии во дишењето или голтањето и/или воспаление на крвните садови вклучувајќи воспаление на малите вени, причинувајќи тврди, црвени петна на кожата.

Во колку забележите некој од овие симптоми веднаш прекинете го земањето на лекот и веднаш обрнете се кај Вашиот доктор!

Ако забележите било какви несакани дејства кои не се споменати во ова упатство, Ве молиме да го информирате Вашиот доктор или фармацевт.

5. ЧУВАЊЕ НА ЛЕКОТ ERYNORM



ЛЕКОТ ЧУВАЈТЕ ГО НА МЕСТА НЕДОСТАПНИ ЗА ДЕЦА!

Да се чува во оригиналното пакување, заштитен од влага и светлина, на температура до 30°C.

Рок на употреба

3 (три) години.

Лекот не смее да се употребува после истекот на датумот на употреба што е наведен на пакувањето.

Начин на издавање

Лекот се издава во аптека само на рецепт.

Инструкции за употреба, ракување и уништување

Неупотребената количина на лекот да се уништи согласно важечките локални прописи.

Датум на последна ревизија на упатството

Број на одобрение за ставање на лекот во промет

Erynorm 50 mg: 15-660/08 од 30.06.2009

Erynorm 100 mg: 15-661/08 од 30.06.2009

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Ако сакате и други информации во врска со овој лек, Ве молиме контактирајте го носителот на одобрението за промет:

**ХЕМОФАРМ А.Д. ФАРМАЦЕВТСКО-ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА
ПРЕТСТАВНИШТВО СКОПЈЕ**

ул.Иво Лола Рибар 39/1-1, Скопје, Р.Македонија

тел: 02/3 227 237

02/3 111 584

