

BETAMETAZON / БЕТАМЕТАЗОН
(betamethasone)

крем
маст

Пред употребата на лекот внимателно прочитајте го упатството.

- Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно
- Ако имате дополнителни прашања, обратете се кај Вашиот доктор или фармацевт
- Овој лек Ви е препишан Вам лично и не треба да им го давате на други лица, бидејќи може да им наштети дури ако нивните симптоми се исти како Вашите

Активна супстанца во БЕТАМЕТАЗОН крем и маст е бетаметазон дипропионат.

1 g крем содржи 0,5 mg бетаметазон во форма на дипропионат.

Помошни супстанции: лаурил макроголглицериди, полиетилен гликол и етилен гликол палмитостеарат, течен парафин, пропилен парахидроксibenзоат, глицерин, пропилен гликол, метил парахидроксibenзоат и прочистена вода.

1 g маст содржи 0,5 mg бетаметазон во форма на дипропионат.

Помошни супстанции: течен парафин, цетил алкохол и бел вазелин.

АТС код: D07CA01

Пакувања:

Број и датум на
решението за промет

Туба со 20 g 0,05 % крем

Туба со 20 g 0,05 % маст

Име и адреса на производителот и носител на одобрение за ставање во промет:

АД ЈАКА 80-Радовиш
Производитна локација:
Првوماјска б.б., Скопје
Република Македонија

Носител на одобрението за ставање во промет:
АД ЈАКА 80-Радовиш
Маршал Тито бр. 2, Радовиш
Република Македонија



1. Што претставува лекот БЕТАМЕТАЗОН и за што се употребува

Бетаметазон е кортикостероид за локална примена со изразено противвоспалително, антиалергиско, имуносупресивно и вазоконстрикторно дејство.

Дејството брзо настапува и е долготрајно и заради тоа може да се употребува кај различни облици и степени на заболувања на кожата.

Кремот е наменет за мрсна кожа и погоден за лекување на влажни дерматози, а маста е наменета за лекување на сувите дерматози.

Бетаметазон се користи кај дерматози кои реагираат на локално лекување со кортикостероиди:

- контактен, себороичен, атопичен, алергиски, иритативен, медикаментозен, фотодерматитис;
- lichen ruber planus
- псоријаза (со исклучок на псоријаза со дифузни површини);
- пруритус (каде бетаметазон се употребува како симптоматска терапија);
- некои облици на еритродермија;
- каснување од инсекти.

2. Што треба да знаете пред да го употребите лекот БЕТАМЕТАЗОН

Немојте да го употребувате лекот БЕТАМЕТАЗОН:

- ако сте алергични на бетаметазон или на некоја од помошните супстанции наведени во ова упатство;
- ако имате туберкулоза на кожа;
- ако имате вирусни инфекции на кожата (херпес, овчи сипаници);
- ако имате специфични процеси на кожата (сифилис);
- ако имате секундарна бактериска инфекција.

Препататот не смеете да го употребувате во близина на очите.

Бидете посебно внимателни со лекот БЕТАМЕТАЗОН:

- кога го употребувате на големи површини на телото;
- кога го употребувате долготрајно;
- кога го нанесувате под оклузивен завој;
- кога го кориситите кај деца;
- ако имате оштетена функција на бубрезите.

Ве молиме да се посоветуваат со доктор и тогаш кога горенаведените укажувања се однесувале на Вас било кога во минатото.

Бременост и доење

Советувајте се со Вашиот доктор или фармацевт пред да употребите било каков лек.



Влијание врз способноста за возење на автомобил или ракување со машини

Бетаметазон кремот и маста не влијаат врз способноста за возење и управување со машини.

Земање на други лекови (на што треба да се внимава ако употребувате други лекови)

Ве молиме да го информирате Вашиот доктор или фармацевт ако земате, или ако неодамна сте земале било кој друг лек, дури и оние кои не се на лекарски рецепт.

Ве молиме да имате во предвид дека овие укажувања можат да се однесуваат и на оние препарати кои што сте ги земале во минатото или ќе ги земате во иднина.

Особено е важно ако истовремено земате и системски кортикостероиди.

3. Како да се употреби лекот

Строго придржувајте се кон упатствата на докторот. Дозите не смеете да ги менувате или лекувањето да го прекинувате без да се посоветувате со доктор.

На заболеното место со благо втривање се нанесува мала количина на маст или крем 1-2 пати дневно, а во некои случаи и до 3 пати. Истата доза потребно е што поскоро да се намали на еднаш дневно.

Подолготрајната употреба потребно е да биде под контрола на лекар.

Следете ги инструкциите освен ако Вашиот доктор не ви препорачал поинаку.

Не заборавајте да го употребите лекот.

Ако имате впечаток дека ефектот на лекот е премногу силен или премногу слаб, посоветувајте се со Вашиот доктор или фармацевт.

Ако сте употребиле поголема доза од лекот отколку што треба (предозирање):


Ако сте употребиле поголема доза од лекот отколку што треба веднаш треба да се посоветувате со Вашиот доктор или фармацевт.

Ако сте заборавиле да го употребите лекот БЕТАМЕТАЗОН:

Употребите ја пропуштената доза колку што е можно побрзо.

Ако е речиси дојдено времето за земање на следната доза, почекајте додека да дојде времето за истата и употребите ја, а прескокнете ја пропуштената доза.

Не земајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената доза



4. Можни несакани дејства

Како и сите лекови, БЕТАМЕТАЗОН може да има несакани дејства.

Ако се случи било што од долунаведеното, веднаш престанете со земањето на лекот и за истото веднаш известете го Вашиот доктор или одете во ургентното одделение во најблиската болница:

- Отекување на лице, усни или грло што може да предизвика тешкотии при голтањето или дишењето;
- исип/ егзантема, уртикарија.

Сите овие се многу сериозни несакани дејства. Ако се појават кај Вас, тоа покажува многу сериозна алергиска реакција на лекот. Во таков случај Ви е потребна итна медицинска помош или хоспитализација.

Сите овие многу сериозни несакани дејства се многу ретки.

Ако забележите некои од следниве симптоми, веднаш известете го вашиот доктор:

- заостанување во растот,
- намалена толеранција кон јаглени хидрати,
- воспаление на фоликулите на влакната (фоликулитис),
- инфекции кои се јавуваат за време или после лекување на друга веќе постоечка инфекција (секундарни инфекции),
- стрии,
- атрофија на кожата.

При долготрајна употреба или при употреба на поголема површина постои можност од појава на хипофизно-адrenalна супресија и Cushing-ов синдром.

Сите овие се сериозни несакани дејства, за кои е потребна итна медицинска помош.

Сериозните несакани дејства се ретки.

Известете го Вашиот доктор ако забележите:

- јадеж,
- исип,
- иритација,
- прекумерен раст на влакна,
- сува кожа,
- намалена пигментација.

Сите овие се слаби несакани дејства.



Ако забележите било какви несакани дејства кои не се споменати во ова упатство, Ве молиме да го информирате Вашиот доктор или фармацевт.

5. Чување на лекот

Да се чува на температура до 25° C, заштитено од светлина.

ЛЕКОТ ЧУВАЈТЕ ГО НА МЕСТА НЕДОСТАПНИ ЗА ДЕЦА!

Рок на употреба

Лекот не смее да се употребува по датумот на истекот на рокот на употреба што е наведен на кутијата и на тубата.

Начин на издавање на лекот

Лекот се издава само со лекарски рецепт.

Датум на последна ревизија на внатрешното упатство

Внатрешното упатство е одобрено на _____

Скопје, март, 2009 г.

