



JADRAN
GALENSKI
LABORATORIJ
d.d.
RIJEKA

Предлог упатство за пациент

OPC Нормиа
Електролити, LGG® BB-12®

стр:

Прочетајте го упатството внимателно пред да почнете да го употребувате лекот.

- Чувајте го ова упатство. Можеби ќе треба да го читате повторно.
- Ако имате некои други прашања, прашајте го својот доктор или фармацевт.
- Овој лек е за лична употреба и не треба да го користат други лица. Тој може да им наштети, иако нивните симптоми се слични со Вашите.

OPC НОРМИА, 10 кесички рехидратацијска сол и 10 кесички Нормиа (Електролити, LGG® BB-12®)

Упатството содржи:

1. Што се OPC Нормиа кесичките и за што се користат
2. Пред да почнете да ги користите OPC Нормиа кесичките
3. Како се употребуваат OPC Нормиа кесичките
4. Можни несакани ефекти
5. Како да се чуваат OPC Нормиа кесичките
6. Дополнителни информации

1. Што се OPC Нормиа кесичките и за што се користат

OPC Нормиа е храна за посебни медицински потреби наменета за:

- диетална исхрана на болни со загуба на електролити и вода при проливи
- рехидратација, надоместок на електролити
- обновување на цревната микрофлора

Рехидратацијската сол служи за приготвување на раствор со кој се надоместува загубата на вода и електролити од организмот.

Посебно одбраните култури на пробиотици *Lactobacillus rhamnosus GG*, LGG® и *Bifidobacterium*, BB-12® ја наследуваат цревната слузница, ја обновуваат цревната микрофлора и заедно на природен начин ја смалуваат пропустливоста на цревната слузница и транспортот на штетни материји.

2. Пред да почнете да ги користите OPC Нормиа кесичките

Бидејќе внимателни при употреба на OPC Нормиа кесичките, особено водејќе грижа за следното:





JADRAN
GALENSKI
LABORATORIJ
d.d.
RIJEKA

Предлог упатство за пациент

OPC Нормиа
Електролити, , LGG® BB-12®

стр:

Пред да њочнејте со употреба на OPC Нормиа кесичкије извесује го Вашиот доктор за здравствениите проблеми што ги имате или сите ги имале порано, како и за сите алергии.

Земање на други лекови

Извесује го Вашиот доктор или фармацевт ако земате или неодамна стие земале било кои други лекови. Ова се однесува и за оние лекови што сите ги кујиле без рецепт, како и за распределниите лекови што претпоставуваат.

Пред да пресујате со употреба на било кој лек што го употребуваате, разговарајте со Вашиот доктор.

При истовремена употреба на OPC Нормиа со антибиотици, се пијат на растојание од 2 часа.

Земање на OPC Нормиа кесичкије со храна или пијалок
Подготвениот раствор се пие постепено, во тек или после јадење.

Бременост и доење

За употреба на OPC Нормиа за време на бременост или доење потребна е консултација со лекар. Нема податоци за тератогени ефекти на OPC Нормиа.

Влијание врз способноста за возење и управување со машини

OPC Нормиа кесичките не влијаат врз способноста за возење и управување со машини.

3. Како се употребуваат OPC Нормиа кесичките

Следејте ги наведените употреба за употреба, освен ако докторот не Ви дал други употреба.
Не заборавајте да го земате лекот. Докторот ќе Ве укажи како и колку долго треба да ги земате OPC Нормиа кесичкије. Не го прекинувајте лечењето пред време.

Содржината од една кесичка рехидратацијска сол се раствора во 200 мл провриена и на собна температура изладена вода. Се пие во мали голтки. Количината на рехидратацијски раствор која треба да се испие, во зависност од степенот на деhidратација, потребно е да ја одреди лекар.





JADRAN
GALENSKI
LABORATORIJ
d.d.
RIJEKA

Предлог упатство за пациент

OPC Нормиа
Електролити, , LGG® BB-12®

стр:

телесна маса (kg)	Рехидратацијски раствор (во мл) во првите 4-6 часа од дехидратацијата		NDK** (ml)
	лесна дехидратација	средна дехидратација	
до 6	150-300	200-400	50
6-9	300-450	400-600	50
9-12	450-600	600-800	100
12-15	600-750	800-1000	150
15-30	750-1500	1000-2000	200
Повеќе од 30 и возрасни	1500-3000	2000-4000	400

**NDK најголема дозволена количина на поединечна доза на рехидратацијскиот раствор

Содржината на една Нормиа кесичка истурете ја во течност или храна на собна температура. Возрасните земаат 2-3 кесички Нормиа на ден. Деца до 12 години земаат 2 кесички Нормиа на ден. При употреба на повеќе кесички на ден, се пијат на растојание од 2 до 3 часа, во тек или после јадење. При истовремена употреба на Нормиа со антибиотици се пијат на растојание од најмалку 2 часа.

Ако сте земале повеќе OPC Нормиа кесички отколку што треба

Ако сте земале повеќе OPC Нормиа кесички отколку што Ви препорачал Вашиот доктор, известете го докторот. Не се познати случаи на предозираност од OPC Нормиа.

Ако сте заборавиле да ја земете дозата од OPC Нормиа кесички

Не земајте двојна доза за да ја надокнадите пропуштената доза!
Земете го лекот што порано и потоа продолжете со употреба според вообичаеното дозирање.

Ако престанете со земање OPC Нормиа кесички

Ако нагло престанете со земање на OPC Нормиа кесички, симптомите може повторно да ви се појават.

4. Можни несакани ефекти

Не постојат позначајни предупредувања за несаканите ефекти на OPC Нормиа. Постој можност за преосетливост кон некоја од составните компоненти.

Секој несакан ефекти треба да се пријави кај докторот или фармацевтот!

5. Како се чуваат OPC Нормиа кесичките





JADRAN
GALENSKI
LABORATORIJ
d.d.
RIJEKA

Предлог упатство за пациент

OPC Нормиа
Електролити, , LGG® BB-12®

стр:

Лекот се чува во оригиналното пакување и на температура до 25°C.

Да се чува на места недостапни за деца.

6. Дополнителни информации

Што содржат OPC Нормиа кесичките

Состојки во 1 кесичка рехидратацијска сол:

глукоза, натриум цитрат, натриум хлорид, калиум хлорид, супстанции за спречување на згрудчување: силициум диоксид; аминокиселински хелат на цинк (пченкарен малтодекстрин, целулоза, натриум карбонат, глицин)

Рехидратацијската сол содржи	во 100g	во 1 кесичка/4,3g	RDA*
глукоза	65,74 g	2,82 g	
хлориди	10,54 g	0,453 g	
натриум	7,88 g	0,339 g 74,4 mmol/l	
калиум	3,65 g	0,157 g	
цинк	0,07 g	3mg	30%

* препорачан дневен внес (Recommended Dietary Allowances)

Осмоларитет: 245 Osm/l одговара на 245 mmol/l.

Состојки во 1 кесичка Нормиа:

Супстанции за зголемување на волуменот: обрано млеко во прав (содржи 50% лактоза), безводна глукоза, инулин, сахароза, малтодекстрин, пробиотски соеви *Lactobacillus rhamnosus GG*, LGG® и *Bifidobacterium*, BB-12® супстанции за спречување на згрудчување: силициум диоксид (E551).

Содржи млеко.

Нормиа содржи	во 100g	во 1 кесичка/ 1,0 g
<i>Lactobacillus rhamnosus GG</i> , LGG® <i>Bifidobacterium</i> , BB-12®	10^{10} - 10^{12} живи бактерии способни за размножување	10^8 - 10^{10} живи бактерии способни за размножување

Енергетската вредност на 1 кесичка рехидратацијска сол е 48 kJ (11 kcal).
Енергетската вредност на 1 кесичка Нормиа е 14.28 kJ (3,41 kcal).





JADRAN
GALENSKI
LABORATORIJ
d.d.
RIJEKA

Предлог упатство за пациент

OPC Нормиа

Електролити, , LGG® BB-12®

стр:

Изглед и содржина на йакувањето
10 кесички рехидрататиска сол и 10 кесички Нормиа, во кутија

Име и адреса на производителот

ЈАДРАН - Галенски лабораториј д.д., Пулац бб, 51000 Ријека, Хрватска, врз основа на лиценца добиена од Chr.Hansen A/S.
BB®-12 е регистрирана трговска марка на компанијата Chr. Hansen.
LGG® е трговска марка на компанијата Valio.

Земја на потекло Италија

Носител на решението за ставање во промет

Еуролек, Качанички пат бр.174, Визбегово
1000 Скопје, Македонија
Тел.: 02-2655-855

Начин и место на издавање на лекот

Лекот се издава без лекарски рецепт, во аптека.

Број на решението за ставање во промет/обнова

.....

Датум на последната ревизија на упатството

