

4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА

Како и сите лекови, РИНГЕРОВ РАСТВОР ВИОСЕР може да има несакани дејства. Администрација на високи дози може да предизвика ретенција на вода и натриум, пулмонален едем и хиперкалемија.

5. ЧУВАЊЕ НА РИНГЕРОВ РАСТВОР ВИОСЕР

Да се чува на температура до 25°C

Лекот чувајте го на места недостапни за деца!

Рок на употреба

Рокот на траење на производот во полиетиленски шишиња е 3 години (36 месеци). Производот треба да се искористи веднаш по отворањето.

Лекот не смее да се употребува по датумот на истекот на рокот на употреба што е наведен на шишето.

Не го употребувајте лекот ако сте забележале дека шишето протекува, растворот е заматен или содржи честички.



Датум на последна ревизија на внатрешното упатство

Број на одобрение за ставање на лекот во промет

94-24-02-00-908



VIOSER SA
PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY,
Taxiarches, Trikala, Грција.

РИНГЕРОВ РАСТВОР ВИОСЕР

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА РИНГЕРОВ РАСТВОР ВИОСЕР

Раствор за инфузија

Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го упатството.

- Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Ако имате дополнителни прашања, обратете се кај Вашиот лекар или фармацевт.
- Овој лек Вие препишан Вам лично и не треба да им го давате на други лица, бидејќи може да им наштети дури и ако нивните симптоми се исти како Вашите.

Упатството содржи:

1. Што претставува РИНГЕРОВ РАСТВОР ВИОСЕР и за што се употребува
2. Што мора да знаете, пред да го употребите РИНГЕРОВ РАСТВОР ВИОСЕР
3. Како да се употребува РИНГЕРОВ РАСТВОР ВИОСЕР
4. Можни несакани дејства (реакции)
5. Чување и рок на употреба на РИНГЕРОВ РАСТВОР ВИОСЕР

РИНГЕРОВ РАСТВОР ВИОСЕР раствор за инфузија
Активна супстанца: натриум хлорид, калиум хлорид, калциум хлорид дихидрат.
Помошни супстанции: вода за инјекции.

Носител на одобрението за ставање во промет
ФАРМАГЕН увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, ул. 29 ноември
69/4, 1000 Скопје, Р. Македонија.

Производител
VIOSER / PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY, 9th km National
Road Trikala-Larisa / Taxiarches, Trikala, 42 100 Грција

M. Zhebolev

Kfy

1. ШТО ПРЕСТАВУВА РИНГЕРОВ РАСТВОР ВАОСЕР И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА

Растворот наменет за интравенска администрација е стерилен, изотоничен и нема бактеријски ендотоксини. Секое пластично шише има заштитно капаче. Пред употреба, треба да се отстранат заштитниот дел и во посебниот еластичен дел да се внесе инфузионит сет.

Состав

100ml раствор за инфузија содржи:

- Натриум хлорид 0,860 g
 - Калиум хлорид 0,030 g
 - Калциум хлорид дихидрат 0,033 g
- Вода за инјекции доволно за 100ml

Концентрација на електролити:

Na ⁺	147,1 mmol/l	(= 147,1 meq/l)
K ⁺	4,0 mmol/l	(= 4,0 meq/l)
Ca ²⁺	2,25 mmol/l	(= 4,5 meq/l)
Cl ⁻	155,6 mmol/l	(= 155,6 meq/l)

Теоретска осмоларност: 309 mOsm/l

РИНГЕРОВ РАСТВОР ВАОСЕР се употребува за супституција на течности при губење на екстрацелуларни течности, при губење на хлор, и како растворувач за концентрирани раствори на електролити.



Полиетиленско шише од 100ml, 500ml и 1000ml.

2. ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА ГО УПОТРЕБУВАТЕ РИНГЕРОВ РАСТВОР ВАОСЕР Немојте да го употребувате РИНГЕРОВ РАСТВОР ВАОСЕР ако:

имате хипернатремија или хиперхлоремија

- доколку шишето протекува и ако растворот не е бистар или содржи видливи честички.

Бременост и доене

Советувајте се со Вашиот лекар или фармацевт пред да земете било каков лек.

Влијание врз способноста за возење или ракување со машини

Нема податоци.

Употребување на други лекови

Да не се меша со раствори кои што содржат фосфати.

Ве молиме да имате во предвид дека овие упатувања можат да се однесуваат и на оние производи што сте ги земале во минатото или ќе ги земате во иднина.

Информирајте го Вашиот лекар или фармацевт ако земате, или неодамна сте земале било кој друг лек, дури и оние кои не се на лекашки рецепти.

3. КАКО ДА СЕ УПОТРЕБУВА РИНГЕРОВ РАСТВОР ВАОСЕР

Потребната доза и времетраењето на РИНГЕРОВ РАСТВОР ВАОСЕР растворот за инфузија ќе ја одреди Вашиот лекар.

РИНГЕРОВ РАСТВОР ВАОСЕР се користи исклучиво во здравствени установи.

РИНГЕРОВ РАСТВОР ВАОСЕР инфузијата ќе Ви ја даде обучено медицинско лице со давање на лекот интравенски (во вена).

Дозирање

Дозирањето зависи од возраста, телесната тежина и клиничката состојба на пациентот.

Растворот треба да се искористи веднаш после отворањето.

Предозирање

При предозирање се зголемува количеството на течности во организмот. Можност од појава на хипернатремија, хиперхлоремија, хиперкалцемија и хиперкалиемија.

При предозирање треба веднаш да се прекине администрацијата на растворот.