

Оземпик® 0,5 mg

раствор за инјектирање во предходно наполнето пенкало
semaglutide

Активна супстанца

Секоја доза (0,37 ml) содржи 0,5 mg semaglutide (1,34 mg/ml)

Листа на помошни супстанции

Динатриум фосфат дихидрат, пропилен гликол, фенол, хлороводородна киселина/натриум хидроксид (за прилагодување на pH), вода за инјектирање.

Фармацевтска форма и содржина на пакување

Раствор за инјектирање

1 пенкало и 4 игли за една употреба (4 дози)

Начин на администрација

Прочитајте го упатството пред употреба

Користете го semaglutide еднаш неделно.

Запишете го денот од неделата кој го одбирате за инјектирање

Ја инјектирав мојата неделна доза на следниве датуми

Супкутана употреба

Посебни предупредувања

Да се чува надвор од дофат на деца.

Останати посебни предупредувања

Не го чувајте пенкалото со закачена игла.

Да се употребува само од страна на едно лице.

Посебни услови на чување.

Да се чува во фрижидер. Да не се замрзнува.

По првата употреба, пенкалото да се чува под 30°C. Да не се замрзнува.

Чувајте го пенкалото затворено со капаче, со цел да се заштити од светлина.

Фрлете го пенкалото 6 недели по првата употреба.

Начин на издавање на лекот

Лекот се издава во аптека само на рецепт (P).

Број на серија:

Рок на употреба:

Број на решение:

АТЦ Код:

A10BJ06

Име и адреса на носител на маркетинг авторизација.

Ново Нордиск Фарма ДООЕЛ

ул., „Никола Кљусев“ бр. 11

1000 Скопје, РСМ

ЕАН Код

5319991025332

