

**Име на лекот: M-M-R VAXPRO / M-M-P ВАКСПРО**

прашок и вехикулум за суспензија за инјектирање во претходно наполнет шприц  
Вакцина против морбили, паротитис и рубеола (жива, атенуирана).

**Состав:** По реконституција, една доза (0,5 ml) содржи:

Вирус на морбили од сој Enders' Edmonston (жив атенуиран) не помалку од  $1 \times 10^3$  TCID<sub>50</sub>

Вирус на паротитис од сој Jeryl Lynn™ [Level B] (жив атенуиран) не помалку од  $12,5 \times 10^3$  TCID<sub>50</sub>

Вирус на рубеола од сој Wistar RA 27/3 (жив атенуиран) не помалку од  $1 \times 10^3$  TCID<sub>50</sub>

\*50% инфективна доза на ткивна култура

<sup>1</sup> произведена во клетки на пилешки ембрион

<sup>2</sup> произведена во WI-38 човечки диплоидни белодробни фибробласти.

**Помошни состојки:** сорбитол, натриум фосфат (NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>/Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>), калиум фосфат (KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>/K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>), сахароза, хидролизирани желатин, медиум 199 со Ханксови соли, минимален Основен Медиум, Eagle (MEM), моносодиум L-глутамат, неомисин, фенол-црвено, натриум бикарбонат (NaHCO<sub>3</sub>), хлороводородна киселина (за да се прилагоди рН), натриум хидроксид (NaOH) (за да се прилагоди рН) и вода за инјекции

**Фармацевтска форма и пакување:**

прашок и вехикулум за суспензија за инјектирање во претходно наполнет шприц,  
1 вијала со прашок и 1 претходно наполнет шприц со вехикулум + 2 игли/кутија.

**Начин на употреба:** за интрамускулна или субкутана употреба.

Да се раствори пред употреба според упатството за употреба.

**Пред употреба внимателно прочитајте го внатрешното упатство!**

**Рок на употреба:** наведен на пакувањето

По реконституција, вакцината треба веднаш да се употреби; сепак, стабилноста при употреба била демонстрирана 8 часа при чување во фрижидер на температура од 2°C – 8°C.

**Начин на чување:** Да се чува и транспортира во фрижидер (2°C – 8°C). Да не се замрзнува.

Чувајте го шишенцето со прашок во картонската амбалажа за да го заштитите од светлина.

Да се чува подалеку од дофат и поглед на деца.

**Начин на издавање на лекот:** Лекот може да се употребува само во здравствена установа (3)

**Производител:** Merck, Sharp & Dohme BV - Харлем, Холандија

**Носител на одобрението за промет:**

Мерк Шарп & Дохме ИДЕА ГмбХ Луцерн Швајцарија - Претставништво Скопје  
Ул. Даме Груев бр. 28, 5-ти кат, Скопје, Р. Северна Македонија

**Број и датум на одобрението за промет:** 11-3359/2 од 28.04.2021

**Број на серија:** наведен на пакувањето

**EAN код:** 5319991566262

