

Tetraxicim/Тетраксим
diphtheria-pertussis-polio-myelitis-tetanus

(DTaP-IPV)

(3)

Суспензија за инјектирање во претходно наполнет шприц

Претходно наполнет шприц x 0.5 ml со една одделна игла. Кутија од 10 шприцеви

Производител:

Sanofi Pasteur

Campus Mérieux
1541 avenue Marcel
Mérieux, 69280 Marcy l'Etoile
France

Sanofi Pasteur

Parc Industriel d'Icarville
27100 Val de Reuil
France

SANOFI AVENTIS Zrt. Budapest
Harbor Park, Campona u.1.
1225 Budapest
Hungary

Застапник:

АМИКУС ФАРМА дооел
бул. Партизански Одреди бр.62
лам.Ц, мез.3, влез 1, 1000, Скопје
Република Северна Македонија

Една доза од 0.5 ml содржи:

Дифтеричен токсоид¹не помалку од 20 IU (30 Lf)

Тетанусен токсоид¹не помалку од 40 IU (10 Lf)

Антигени на *Bordetella pertussis*:

Пертусис токсоид25 микрограми

Филаментозен хемаглутинин¹25 микрограми

Полио вирус (инактивиран)

- Тип 1 (сој Mahoney).....29 D-антигенски единици

- Тип 2 (сој MEF-1).....7 D-антигенски единици

- Тип 3 (сој Saukett).....26 D-антигенски единици

¹ Адсорбирана на алюминиум хидроксид, хидриран.....0.3 mg Al³⁺

Листа на експириенси: алюминиум хидроксид, Hanks медиум 199 без фенол црвено (вклучувајќи фенилаланин), глацијална оцетна киселина и/или натриум хидроксид за прилагодување на pH, формалдехид, фенокситетанол, анхидриден етанол и вода за инјекции.

Начин на употреба: интрамускулно

Пред употреба внимателно прочитајте го внатрешното упатство.

Да се чува на места недостапни за деца!

Да се чува во фрижидер (2°C - 8°C). Да не се замрзува.

Лекот може да се употребува само во здравствена установа!

Реш. Бр.:

EAN код: 3664798056730

® Заштитено име

Серија : назначено на оригиналното пакување

Важи до : Назначено на оригиналното пакување

