

REVAXIS/РЕВАКСИС**(3)***diphtheria-tetanus-poliomyelitis* (DTP/Td-IPV)

Суспензија за инјектирање

1 наполнет инјекциски шприц x 0.5 ml со една одделна игла/кутија

Производител:

-Sanofi Winthrop Industrie
1541 avenue Marcel Merieux
69280 Marcy l'Etoile
France
- Sanofi Winthrop Industrie
Voie de l'Institut
Parc Industriel d'Incarville B.P 101
27000 Val de Reuil
France
- Sanofi-Aventis Zrt
Building DC5
Campona utca 1.
1225 Budapest
Hungary

Застапник:

АМИКУС ФАРМА дооел
бул. Партизански Одреди бр.62,
лам.Ц, мез.3, влез 1, 1000, Скопје
Република Северна Македонија

Една доза од 0.5 ml содржи:

дифтеричен токсид ≥ 2 IUтетанусен токсид ≥ 20 IU

Полиомиелитис вируси (инактивиран, произведен на Vero клетки)

Тип 1 29 D антигенски единици

Тип 2 7 D антигенски единици

Тип 3 26 D антигенски единици

Адсорбирана врз алуминиум хидроксид, 0.35 mg (Al)

Помошни супстанции:

Феноксиетанол, етанол безводен, формалдехид, оцетна киселина, натриум хидроксид,
Медиум 199 (смеса од аминокиселини, вклучително фенилаланин, соли на минерали,
витамины, полисорбат 80, хлороводородна киселина, натриум хидроксид и други
супстанции) и вода за инјекции.

Начин на употреба: интрамускулно.**Пред употреба внимателно прочитајте го внатрешното упатство.****Пред употреба добро протресете.****Да се чува на места недостапни за деца!****Да се чува на температура помеѓу +2°C и +8°C (во фрижидер). Да не се замрзнува.****Секој неупотребен продукт или отпаден материјал треба да се отстрани во согласност со локалните прописи.****Лекот може да се употребува само во здравствена установа!**

Реш.Бр: 11-10889/2 од 21.12.2021

® Заштитено име

Серија: Назначено на оригиналното пакување

Важи до: Назначено на оригиналното пакување

