

	ETUI-TOTHEMA-121,5x41,5x166,8-G du 05 septembre 2019		Anclen code Article : 533350-06-19
	Etui TOTHEMA 20 ampoules - Bosnie/Macédoine	534023-11-20 VERSION 1	Nature de la Modification : Variations « shake before use » et « conditions conservation 30° C »
Intervenant Studio : Sébastien Anglement	Format : 121,5x41,5x166,8 mm Grammage : 325g/m ²	DATE : 10/12/2020	Ref. : NA Code Laetus : NA Taille mini Police utilisée : 7 points
Gestionnaire BAT Chouzy : Maxime Guillou Tel : 02 54 51 22 00	COULEURS 		Découpe + Braille

Braille T1(N2)



tot'hema

20 ampula
oralna upotreba

ATC: B03AE10

tot'hema[®]

oralni rastvor, 20 ampula po 10 ml
peroralni rastvor, 20 ampuli po 10 ml

tot'hema[®]
ORALNI RASTVOR

50 mg/10 ml + 1,33 mg/10 ml + 0,70 mg/10 ml
gvožđe (II)-glukonat, mangan-glukonat, bakar-glukonat

Proizvođač:

INNOTHERA CHOUZY, Rue René Chantereau, Chouzy-sur-Cisse, 41150 VALLOIRE-SUR-CISSE, Francuska

Nositelac dozvole:

PHOENIX PHARMA d.o.o. Bijeljina, Danja Ljeljenča br 015B, Ljeljenča, Bijeljina

Broj i datum rješenja:

04-073-2-9078/16 od 18.07.2017

Lijek čuvati izvan dohвата i pogleda djece!
Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo!

Lijek ne smijete koristiti poslije isteka roka upotrebe
navedenog na pakovanju.

Čuvati na temperaturi do 30 °C.
Neopotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim
propisima.

Jedna ampula sa 10ml oralnog rastvora sadrži:
gvožđe (II)-glukonat..... 50 mg (izraženo na gvožđe)
mangan-glukonat..... 1,33 mg (izraženo na mangan)
bakar-glukonat..... 0,7 mg (izraženo na bakar)

Pomoćne supstance: glukoza, tečna, saharoza; etanol.
Oralna upotreba.
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

20 ампули
орална употреба

ATC: B03AE10

tot'hema[®]
Перорален раствор

50 mg/10 ml + 1,33 mg/10 ml + 0,70 mg/10 ml
железо(II) - глуконат, манган-глуконат, бакар-глуконат

Производител:

INNOTHERA CHOUZY, Rue René Chantereau, Chouzy-sur-Cisse, 41150 VALLOIRE-SUR-CISSE, Francuska

Nositelac rješenja:

РМ Фарма, СЕПТИМКА РАСТОР УП, Адисто Татарчев 13, 6p.9, Скопје

Broj i datum na rješenju:

11-195/11-2017 od 10.01.2020.

Lijek čuvati se čuva izvan dohвата i pogleda djece!
Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo!
Lijek ne smijete koristiti poslije isteka roka upotrebe
navedenog na pakovanju.

Čuvati na temperaturi do 30 °C.
Neopotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim
propisima.

Jedna ampula od 10ml peroralnog rastvora sadrži:
50mg željezo(II) (vo forma na željezo(II) glukonat)
1,33 mg mangan (vo forma na mangan glukonat)
0,70 mg bakar (vo forma na bakar glukonat)

Pomoćne supstance: glukoza, tečna;
saharoz; etanol.
Peroralni rastvor
50 mg/10ml + 1,33 mg/10ml + 0,7 mg/10ml
20 ampuli po 10ml
Oralna upotreba.
Lijek se izdaje samo so lekarski recept.



534023



3 400970 000999

534023-11-20