

10 Виаги
Меропенем/Анфарм®
Meropenem trihydrate
1g I.V.



Прахок за раствор за инјектирање или инфузија
за интравенска администрација

Последи мисли на припадност при употреба и ракување

Инфекција

Меропенемот што се користи за болус интравенска инфузија мора да се реконституира со стерилна вода за инфузии.

Индикација

Виагитот со меропенем за интравенска инфузија може да бидат директно реконституирани со 0.9% раствор на хлориди хлорид или 5% раствор на глюкоза за инфузија.

Особејта мисла да се употребува само за една доза.

При подготовка на растворот и при администрацијата треба да се користат стандардни асептични техники.

Растворот пред употреба треба добро да се промеша.

Особејта мисла при употреба или при употреба на препаратот треба да се острани во општеството со локалитетите барања.

Продавачката АНФАРМ НЕЛАС С.А. Скопје, Македонија, 2009 Године

УЛ. 24 БР. 54 Илинден Илинден Р. Скопје, Македонија

Број на одобрување за ставање на пазар во промет:

Решетот да се чува 2 години.

АТС код: J01DH02

10 Vials

Меропенем/Анфарм®

Meropenem trihydrate

1g I.V.

Powder for solution for injection/infusion
for intravenous administration only



Меропенем/Анфарм®, 1 g, прахок за раствор за инјектирање или инфузија

Активна супстанција: Меропенем трихидрат кој одговара на 1g Меропенем.

Прахок за раствор за инјектирање или инфузија

Готовина на пакување: картонска кутија со 10 виаги.

Помошни супстанции: Базовен натриум карбонат.

Да се раствора пред употреба според упатството.

Пред употреба внимателно прочитајте го приложено упатство.

Да се чува на места недоступни за деца.

Да се чува на температура до 25°C. Да се чува на место заштитено од светлина. Да не се замрзнува.

Реконституираниот раствор треба да се искористи веднаш.

Не може да се чува подолго од 24 часа, доколку тоа е неизбежно, да се чува во фрижидер.

10 Vials
Меропенем/Анфарм®
Meropenem trihydrate 1 g I.V.

Бр. на серија:
Рок на траење:

